



1. Una gestante de 34 años acude por su cuarto control prenatal. A su valoración de enfermería se determina 28 semanas de gestación y riesgo de parto prematuro que conlleva a que el recién nacido presente enfermedad de membrana hialina. ¿Qué acción profiláctica debe aplicar?

Respuestas:

- Aplicación de fludrocortisona.
- Administración de betametasona.
- Administrar gluconato de calcio.
- Iniciar aplicación de labetalol.

2. Un paciente de 18 años, desde hace 6 meses con pérdida de peso, tiene buen apetito anímicamente estable, refiere en las noches alteración del sueño, pero en el día no siente cansancio. Llega a consulta preocupado. Se realiza análisis profundo porque cuadro clínico es insidioso, aplicando el método clínico. ¿Qué etapa permite plantear el diagnóstico inicial

Respuestas:

- Comprobación.
- Formulación del problema.
- Recogida de la información.
- Elaboración de hipótesis.

3. La leche materna es un fluido dinámico, que se adapta las necesidades del niño y a su velocidad de crecimiento, por lo tanto, es el alimento ideal para la especie humana y tiene diferencias significativas con la leche de vaca y la leche artificial. Relacione las características y el tipo de leche al que pertenecen:

Características	Tipo de leche
1. Libre de contaminantes bacterianos, tiene factores antiinfecciosos y de crecimiento, lactoalbúmina como proteína predominante que es de fácil digestión, ácidos grasos esenciales y lipasa para la digestión, el hierro está en forma ferrosa y en pequeña cantidad, vitaminas y agua en proporción adecuada.	a. Leche de vaca
2. Probables contaminantes bacterianos, sin factores antiinfecciosos ni de crecimiento, escasos ácidos grasos esenciales, la proteína dominante es la caseína de difícil digestión, sin lipasa, y con hierro en	b. Leche materna

pequeña cantidad en forma férrica, insuficiente cantidad de vitamina A, C y agua.	
3. Libre contaminantes bacterianos, sin factores antiinfecciosos ni de crecimiento, tiene proteínas parcialmente corregidas, faltan ácidos grasos esenciales, no tiene lipasa, tiene hierro añadido que no se absorbe bien, vitaminas añadidas y requiere agua extra.	c. Leche artificial

Respuestas:

- 1a, 2b, 3c.
 - 1b, 2c, 3a.
 - 1b, 2a, 3c.
 - 1c, 2b, 3a.
4. **Florence Nightingale es reconocida como la impulsora de la Enfermería profesional organizada. ¿Cuál de los siguientes hitos históricos está relacionado con este personaje?**
- Guerra Civil española.
 - Las cruzadas de la Edad Media.
 - La Guerra de Crimea.
 - Edad Antigua.
5. **El profesional enfermero debe realizar en su actividad administrativa el cálculo de materiales y equipos que debe utilizar en la aplicación de procedimientos de enfermería en el área hospitalaria. ¿Qué factores influyen en la dotación efectiva de materiales y equipos?**
- Respuestas:**
- Actividades, estrategias, diagnóstico situacional, planificación de consumos.
 - Liderazgo, toma de decisiones, motivación continua, coordinación de actividades.
 - Curva estándar de consumo, porcentaje de ocupación, frecuencia de tratamientos.
 - Programación de necesidades, selección de insumos, almacenamiento y distribución.
6. **Paciente masculino de 15 meses, acude al control en el centro de salud, sin patología aparente, ni antecedentes personales ni familiares, esquema de vacunación, examen físico normal. Desarrollo neuromotor adecuado para la edad. Se recomienda continuar la lactancia y alimentación complementaria y**



control en 6 meses. ¿Qué vacuna debe administrarse a los 15 meses de acuerdo con el esquema nacional de vacunación?

Respuestas:

- Primera dosis de SRP.
- Primera dosis de hepatitis A.
- Dosis única HPV.
- Dosis única de varicela.

7. Mujer de 24 años acude al Centro de Salud del centro histórico multigesta con contracciones de aproximadamente un minuto de duración y antecedentes de preeclampsia. Al interrogatorio revela que tuvo tratamiento profiláctico con Ácido Acetil Salicílico. Al examen físico se encuentra dilatada 10 cm. Por lo que se la prepara para ingreso a la Unidad de trabajo de parto y recuperación (UTPR). Durante el parto la madre presentó fluctuaciones significativas de la presión arterial, por lo que se empieza a tramitar la transferencia. Con el fin de salvar la vida de la madre, es aceptada en el Hospital gineco-obstétrico. A qué nivel de atención pertenece esta unidad hospitalaria

Respuestas:

- Cuarto nivel de atención.
- Tercer nivel de atención.
- Segundo nivel de atención.
- Atención prehospitalaria.

8. Paciente femenina de 75 años, evaluada en consulta preoperatoria. Se va a someter a mastectomía radical por cáncer de mama. Antecedente de hipertensión arterial de 10 años de evolución en tratamiento con enalapril. Alergia documentada a la penicilina con desencadenamiento de shock anafiláctico. Al examen físico presenta tensión arterial 120/80 mmHg, (sin ortostatismo), frecuencia cardíaca 74 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 16 por minuto. Laboratorio: hemoglobina 14 mg/dL, hematocrito 42 %, leucocitos 9800, plaquetas 220000. Rx tórax: sin lesión pleural pulmonar activa. Electrocardiograma sin cambios en T o segmento ST.

¿Cuál es el antibiótico más apropiado para el manejo profiláctico de esta paciente?

Respuestas:

- Cefazolina.
- Ciprofloxacina.
- Clindamicina.
- Ceftriaxona.



9. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto con respecto a los cambios relacionados con el envejecimiento?

Respuestas:

- Aumento del gasto cardiaco y disminución de la tensión arterial.
- Aumento de la sensación de sed, aumento de la salivación y vaciamiento gástrico acelerado.
- Disminución de la grasa subcutánea, del líquido intersticial y de los receptores sensoriales.
- Las mujeres presentan un ensanchamiento vaginal con aumento de las secreciones vaginales.

10. Según la clasificación de severidad clínica en el embarazo, ¿en qué parámetros de hemoglobina existe anemia moderada?

Respuestas:

- 10.1 g/dl – 10.9 g/dl.
- Menor de 7.1 g/dl.
- 7.1 g/dl – 10.0 g/dl.
- Mayor de 11 g/dl.

11. Paciente femenina de 4 años, acude por presentar resequedad de piel, diarreas frecuentes, alteración de la visión especialmente nocturna. Sin antecedentes personales y vacunas completas. Al examen físico se observa peso y talla bajos para la edad, piel, placas descamativas secas e hiperqueratosis, más frecuentes en brazos, piernas, hombros y nalgas. Ojos, manchas de Bitot. ¿Cuál considera el diagnóstico más probable?

Respuestas:

- Déficit de vitamina A.
- Déficit de vitamina C.
- Déficit de vitamina D.
- Déficit de vitamina B.

12. Con relación a la osteoporosis, complete el siguiente enunciado:

La osteoporosis primaria puede aparecer en la _____, la osteoporosis secundaria se asocia a factores como _____ y _____.

Respuestas:

- Postmenopausia - uso de corticosteroides - enfermedad celíaca.
- Senectud - edad del paciente - aumento en la ingestión de calcio.
- Pubertad - consumo de calcio - ejercicio de soporte de peso.



- Senectud - uso de anticonvulsivos - aumento en la ingestión de calcio.

13. ¿Cuál es el micronutriente que previene la anencefalia, mielomeningocele y encefalocele durante el embarazo?

Respuestas:

- Hierro.
- Potasio.
- Ácido fólico.
- Calcio.

14. Paciente con antecedentes de sobredosis de sedantes, con manifestaciones de obnubilación, taquicardia e hipertensión arterial. Se realiza Gasometría Arterial cuyos resultados son: pH. 7.28, PaCO₂. 54 mmHg, PaO₂. 83 mmHg, H₂CO₃. 25 mEq/l ¿Qué trastorno se pone de manifiesto?

Respuestas:

- Acidosis respiratoria.
- Alcalosis respiratoria.
- Acidosis metabólica.
- Alcalosis metabólica.

15. La cadena de frío para la conservación de las vacunas utiliza los termos, que son recipientes de pequeñas dimensiones que permiten transportar y conservar las vacunas a una temperatura de +2 °C a +8 °C, sin ser abiertos conservan la temperatura hasta 36 horas y 22.5 horas al abrirlos unas 16 veces con 2 minutos de duración cada vez que lo abra. ¿Cuáles son las recomendaciones para mantener la temperatura correcta de las vacunas dentro del termo?

Respuestas:

- Llenar de agua todo el paquete frío y colocar esponjas o cualquier otro material dentro del termo.
- Mantener la tapa del termo bien cerrada para que las vacunas estén en contacto con el agua del deshielo.
- Colocar las vacunas en vasos plásticos, evitar que el agua del deshielo de los paquetes fríos moje las vacunas.
- Colocar el termo a la sombra o en el lugar lo más fresco posible, evitar mantener la tapa del termo abierta.

16. Una paciente femenina de 29 años G2P1HV1, 36 semanas de gestación, antecedente decide realizar cesárea de emergencia debido a estado fetal no tranquilizador, tras: presentó frecuencia cardiaca de 110 latidos por minuto, esfuerzo respiratorio lento, ir cianosis distal en extremidades. A los cinco

minutos de vida presenta frecuencia cardiaca X, presenta cianosis distal en extremidades. ¿En base al índice de APGAR cual es el puntaje del paciente?

Respuestas:

- Índice de APGAR 8-9.
- Índice de APGAR 8-8.
- Índice de APGAR 7-9.
- Índice de APGAR 5-7.

17. Paciente de 50 años, es atendido en emergencia. Al examen físico TA= 130/70 mmHg, FC= 110X', FR= 36X', T° =38.5°C, se encuentra intranquilo, presenta dolor torácico pleurítico, disneico, tos con expectoración mucopurulenta que le es difícil eliminar y escalofríos. Según NANDA 2021-2023.

¿Cuál es el diagnóstico de enfermería prioritario en este caso?

Respuestas:

- Riesgo de intolerancia a la actividad R/C desequilibrio entre el aporte y demanda de O₂.
- Temor R/C entorno desconocido M/P intranquilidad.
- Despeje ineficaz de las vías respiratorias R/C mucosidad M/P disnea y taquipnea.
- Hipertermia R/C enfermedad M/P taquicardia.

18. Un paciente de 50 años postquirúrgico de hernioplastia inguinal, debe ser dado de alta de la unidad de recuperación posanestésica (URPA), en la valoración según la escala de Aldrete se encuentra lo siguiente: mueve las cuatro extremidades voluntariamente, respira profundo y tose libremente, TA: 120/80, FC: 80 lpm, Sat: O₂ 92 %, y responde cuando es llamado. Según sus conocimientos. ¿Cuál es el puntaje que tiene este paciente y según este puntaje puede ser dado de alta de la URPA?

Respuestas:

- 9 puntos, no puede ser dado de alta de la URPA.
- 9 puntos, si puede ser dado de alta de la URPA.
- 10 puntos, si puede ser dado de alta de la URPA.
- 8 puntos, no puede ser dado de alta de la URPA.

19. Adulto mayor de 70 años, ingresa al servicio de neurología en estado inconsciente, se observa una delgadez extrema, familiares manifiestan que tiene algunos días sin comer, al realizar la valoración clínica se detecta buena función intestinal. Según su criterio. ¿Cuál sería la vía de acceso más adecuada para iniciar la alimentación?

Respuestas:



- Por vía oral.
- Por vía parenteral.
- Por vía naso entérica.
- Por vía mixta (enteral y parenteral).

20. Un paciente masculino de 42 años que no refiere antecedentes patológicos personales: antecedente patológico familiar: padre y madre diagnosticados de HTA. Al momento se encuentra asintomático: acude para control. Al examen físico: FC: 80 lpm con ruidos normales, FR: 12 rpm, temperatura 37 °C, tensión arterial 138/88 mmHg, talla 163 cm, peso 80 kg. El resto del examen físico es normal. Usted realiza un diagnóstico de presión arterial normal alta y envía a realizar exámenes. Decide empezar con cambios en el estilo de vida, por lo que solicita restricción en el consumo de sal a 5 gramos por día. ¿Cuál sería el valor de tensión arterial?

Respuestas:

- 124/88.
- 118/88.
- 130/88.
- 110/88.

21. Relacione las alteraciones en el nivel de conciencia con sus definiciones.

Alteraciones del nivel de conciencia	Definiciones
1. Confundido	a. Estado de somnolencia profundo y prolongado, procesos de pensamiento enlentecidos.
2. Letárgico	b. Estado patológico que se caracteriza por la pérdida de la conciencia, la sensibilidad y la motricidad.
3. Obnubilado	c. Desorientado temporal, espacial y persona con dificultad para seguir órdenes.
4. Estuporoso	d. Alteración en la que disminuye el nivel de conciencia, lentitud psicomotora, despierta con estímulos persistentes.
5. Coma	e. Solo despierta ante estímulos dolorosos, con localización adecuada del mismo y respuesta verbal incomprensible.



Respuestas:

- 1a, 2b, 3c, 4d, 5e.
- 1b, 2e, 3a, 4c, 5d.
- 1c, 2a, 3d, 4e, 5b.
- 1e, 2c, 3b, 4a, 5d.

22. Paciente femenina de 40 años que padece de Diabetes Mellitus tipo II, al recibirla en el servicio de Emergencia, se encuentra con una presión arterial de 90/50 mmHg, pulso de 55 lpm, respiración de 18 rpm y temperatura de 36 °C, la concentración de glicemia es de 215 mg/dL. Al analizar los resultados de electrolitos, usted identifica que el sodio se encuentra en 129 mEq/L; además, la paciente se muestra confundida, débil y con la boca seca. Considerando los factores contribuyentes y las manifestaciones clínicas. ¿Cuál de los siguientes trastornos del equilibrio electrolítico considera que presenta la paciente?

Respuestas:

- Hipernatremia.
- Hipopotasemia.
- Hiperpotasemia.
- Hiponatremia.

23. En visita domiciliaria a familia extendida integrada por 15 personas, todas las generaciones han padecido de cáncer, y algunos han muerto por diabetes, viven en condiciones sanitarias inadecuadas y no asisten al centro de salud para el control médico regular. Señale el criterio de selección aplicado en la visita domiciliaria descrita:

Respuestas:

- Demográfico.
- Socioeconómico.
- Epidemiológico.
- Administrativo.

24. Cuadro caracterizado por otalgia, otorrea, purito a nivel de oído en la audición derecha. Al examen físico presenta dolor a tirar el pabellón auricular derecho para el examen otoscopio, eritema, edema y detritos en el conducto externo. ¿Cuál es el diagnostico presuntivo?

Respuestas:

- Otitis externa.
- Otitis media.
- Colesteatoma adquirido.



- Carcinoma cutáneo epidemoide.

25. Paciente de 2 meses de edad, traído por su madre a emergencias por fiebre e irritabilidad de 5 días de evolución. La fiebre es de 39 grados centígrados, varios picos al día, de difícil control con antitérmicos, se acompaña de gran irritabilidad. Acudió al pediatra, quien prescribió acetaminofén alternado con ibuprofeno, sin mejoría. Al examen físico signos vitales normales, paciente en regular estado general, limitable, fontanela anterior normotensa, no signos de focalización infecciosa. Exámenes: leucocitos 15.000/mm³, neutrófilos 70% hemoglobina 11 gr/dl, plaquetas 200.000/mm³, proteína C reactiva 100 mg/L, elemental y microscópico de orina tomado por sonda vesical: leucocitos +++, nitritos positivos, bacterias: bacilos gram negativos +++, urocultivo pendiente resultado. ¿Cuál es la conducta a tomar con este paciente?

- Hospitalizarlo sin antibióticos hasta recibir resultado de urocultivo.
- Observarlo 8 horas para decidir si se lo envía a casa u hospitaliza.
- Realizar punción vesical comprobar el diagnóstico y decidir conducta.
- Hospitalizarlo con ceftriaxona intravenosa.

26. Paciente de 90 años portadora de sonda enteral, el médico prescribe metformina de 500 mg, pero solo se dispone en presentación de 850 mg. Para administrar la medicación se debe diluir con 10 ml de agua. ¿Cuántos ml del medicamento se debe administrar?

Respuestas:

- 5.5 ml de la mezcla.
- 5,8 ml de la mezcla.
- 5ml de la mezcla.
- 6 ml de la mezcla.

27. Paciente masculino de 83 años con IMC de 31 y antecedentes patológicos personales de hipertensión arterial y diabetes mellitus desde hace 4 años con tratamiento continuo, acude al control en su centro de salud, en compañía de su familiar. Usted nota que la información que maneja el familiar de su paciente es deficiente para minimizar los riesgos de la atención en salud domiciliaria. ¿Cómo se denomina la precaución para minimizar el riesgo o eliminar los peligros de quien trabaja como cuidador?

Respuestas:

- Precaución 3. Uso de guantes.
- Precaución 1: Higiene de manos.
- Precaución 2. Equipo de protección personal (EPP).
- Precaución 8. Higiene respiratoria.



28. Como licenciado en enfermería realiza la visita domiciliaria a una familia en etapa de contracción, donde ambos cónyuges son adultos mayores con dependencia funcional. ¿Qué actividad prioritaria se realiza teniendo en cuenta los factores de riesgo?

Respuestas:

- Orientar una dieta hipercalórica y fraccionada.
- Facilitar silla de ruedas y cuidadores.
- Planificar un plan rutinario de ejercicios.
- Garantizar reposo minimizando las actividades.

29. La NANDA incluye algunas etiquetas diagnósticas para pacientes con problemas respiratorios. Relacione las etiquetas diagnósticas con las intervenciones de enfermería que correspondan:

NANDA ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS	NIC INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
1. Limpieza ineficaz de vías aéreas.	a) Oxigenoterapia y control de su eficacia.
2. Deterioro del intercambio de gases.	b) Monitorización respiratoria.
3. Patrón respiratorio ineficaz	c) Aspiración de las vías aéreas.
4. Riesgo de aspiración.	d) Incremento de la tos.

Respuestas:

- 1b, 2a, 3d, 4c.
- 1a, 2b, 3c, 4d.
- 1c, 2b, 3d, 4a.
- 1d, 2c, 3a, 4b.

30. Mujer lleva a la unidad de salud por control de niño sano a su hijo de 11 meses, luego de la revisión médica, el profesional encuentra que el niño está bajo de peso para la edad y solo ha recibido las vacunas de los 2 meses, por lo tanto, remite a la madre al vacunatorio. El profesional de enfermería revisa el carnet y corrobora lo reportado por el médico. ¿Qué intervención de enfermería corresponde?

Respuestas:

- Aplicar 2da. dosis de: neumococo y pentavalente.
- Aplicar 2da. dosis de: Rotavirus, fIPV, neumococo y pentavalente.
- Aplicar 2da. dosis de: bOPV, neumococo y pentavalente.
- Aplicar 2da. dosis de: fIPV, neumococo y pentavalente.



31. ¿Cuál es la zona corporal recomendada y en qué posición deberá estar el paciente para administrar medicamento por vía Intra Muscular (IM)?

Respuestas:

- Brazos – de pie.
- Muslos – supino.
- Glúteos – dorsal.
- Gran dorsal – ventral.

32. Paciente masculino de 50 años, acude al Centro de Salud por presentar cefaleas frecuentes y persistentes sin antecedentes patológicos conocidos. El profesional en Enfermería de la sala de preparación valora los signos vitales: TA =160/95 mmHg, FC = 78 lpm, FR = 18 por minuto, T = 36,5 grados centígrados, SPO2=99%, esta incluye la medición cuidadosa de la presión arterial de manera sistemática. ¿Cuál sería la conducta que debe seguir el profesional en Enfermería en el control de la Tensión arterial (TA)?

Respuestas:

- Tomar dos lecturas de la tensión arterial (TA) con una diferencia de 1 a 2 minutos en cada medición.
- Tomar tres lecturas de la tensión arterial (TA) con una diferencia de 5 a 10 minutos en cada medición.
- Tomar dos lecturas de la tensión arterial (TA) de 3 a 5 minutos en cada medición con el paciente acostado e indicarle que haga silencio.
- Tomar dos lecturas de la tensión arterial (TA) con una diferencia de 3 a 5 minutos en cada medición.

33. Paciente femenina de 19 años que cursa un embarazo de 20 semanas acude a consulta por presentar secreción vaginal en abundante cantidad, picazón en región genital, dolor y ardor al orinar. Al examen físico se identifica FCF normal. ¿Qué actividad corresponde a este caso?

Respuestas:

- Atención y tratamiento para la infección.
- Citología Vaginal.
- Educación sobre los cuidados para prevenir complicaciones.
- Educación sobre la patología, sus causas y riesgos en el embarazo.

34. Una paciente femenina de 16 años cursa un embarazo de 36.5 semanas según la ecografía del primer trimestre, Ingresa al hospital en expulsivo, parto céfalo vaginal, Se recibe un recién nacido masculino con llanto fuerte, frecuencia cardiaca 140 lpm. Apgar 9. Líquido amniótico de mal olor. Rotura de

membranas de 21 horas. ¿Qué factores de riesgo para infección presenta el recién nacido?

Respuestas:

- Rotura de membranas de 21 horas.
- Líquido amniótico transparente con grumos.
- Parto céfalo vaginal, en expulsivo.
- Madre adolescente.

35. En el servicio de pediatría, se recibe un paciente en post operatorio inmediato de ostomía, al evaluar la posibilidad de que el sistema colector que se va a colocar mantenga un sello seguro y evite la filtración del afluyente por debajo de la barrera del sistema. ¿A qué característica de valoración corresponde?

Respuestas:

- Tipo de ostomía.
- Viabilidad de ostomía.
- Construcción de ostomía.
- Altura de ostomía.

36. Un paciente masculino de 28 años, acude a consulta externa por presentar desde hace tres días, disfagia y odinofagia acompañada desde hace 24 horas de fiebre y escalofrío. A la exploración física presenta orofaringe hiperémica, amígdalas aumentadas de tamaño con criptas pustulosas bilateralmente; inmediatamente facultativo toma una muestra y envía para cultivo y antibiograma, en el examen de laboratorio demuestra crecimiento *Streptococcus pyogenes*, sensible penicilina y ciprofloxacina, el médico prescribe penicilina procaínica y benzatínica intramuscular, pese al deseo del paciente de no querer recibir medicamento con ese tipo de vía de administración, estableciendo que es mejor para él y su bienestar este procedimiento. ¿Qué relación clínica se establece en este caso?

Respuestas:

- Paternalista.
- Interpretativo.
- Deliberativo.
- Informativo.

37. Un paciente masculino de 68 años, sin antecedentes patológicos, acude por presentar desde hace 2 meses disnea progresiva y dolor en punta de costado izquierda. En Rx de tórax se evidencia derrame pleural izquierdo masivo, usted realiza toracocentesis y solicita estudios complementarios. ¿Qué parámetros son necesarios para establecer los criterios de Light?



Respuestas:

- Celularidad y diferencial del líquido pleural.
- LDH + proteínas del líquido pleural y del suero.
- ALT + fosfatasa alcalina del líquido pleural y del suero.
- Fosfatasa alcalina + proteínas del líquido pleural.

38. Paciente de 55 años de sexo masculino, acude al área de emergencia por presentar: anorexia, sudoración nocturna y baja de peso además de tos productiva, con 1 mes de evolución, con antecedentes de diagnóstico de tuberculosis, drogoresistente hace 5 años. Recibe tratamiento de tuberculosis primera fase. Sus signos vitales son: T: 40 °C; FC: 95/min; TA: 110/90mmHg; FR 22/min; Sat.O2: 94%. En el examen de laboratorio complementario se diagnóstica tuberculosis, en la tomografía de tórax se observan condensaciones con excavaciones, post-primaria. Además, en la prueba de fármaco presenta resistencia a fluoroquinolona y a los tres medicamentos inyectables de segunda línea. ¿Cuál es el tipo de resistencia de los medicamentos, basado en este caso?

Respuestas:

- Extensamente resistente (XDR).
- Monorresistencia.
- Multidrogorresistencia (MDR).
- Polirresistencia.

39. Un paciente varón de 32 años acude por presentar una masa en el cuello. La masa es indolora y se mueve verticalmente a la deglución. Una ecografía del cuello revela una masa de 2.6 cm en el lóbulo derecho, en la proximidad del istmo. La masa tiene microcalcificaciones, es hipoecogénica y tiene bordes irregulares. Se realiza una citología tras una punción con aguja fina y reporta células atípicas, abundantes, con cuerpos de psamoma. ¿Cuál es el gen mutado que con más frecuencia induce este tumor a través de la vía de transducción de señales intracelulares P quinasa?

Respuestas:

- L-MYC.
- BRAF.
- VHL.
- N-MYC.

40. Paciente se encuentra en el servicio de terapia intensiva con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico grave. Al momento se encuentra inconsciente, entubado, presenta náusea. A la valoración física se observa que el paciente

necesita higiene oral. Por su estado de inconsciencia ¿De que se debe proteger al paciente durante la higiene oral?

Respuestas:

- Vómito o emesis.
- Aspiración.
- Secreción Salival.
- Reflejo Faríngeo.

41. A la emergencia llega una mujer de 35 años cuyo historial no incluye enfermedades asociado a factores de riesgo de resistencia antimicrobiana: no fuma y se ejercita regularmente. Hace 96 horas presentó tos, escalofríos, sensación de malestar y taquicardia. Hace 48 horas presenta alza térmica, astenia, cefalea, tos productiva con expectoración que se torna mucopurulenta en las últimas 24 horas. Al examen físico, usted evidencia taquipnea, retracciones intercostales, aumento del frémito en base pulmonar derecha, con estertores crepitantes y matidez en la misma zona. La Rx de tórax muestra infiltrados neumónicos en base derecha sin derrame pleural. Usted ha diagnosticado una Neumonía extrahospitalaria y decide iniciar tratamiento antibiótico. ¿Cuál de las siguientes opciones es adecuada para el caso?

Respuestas:

- Iniciar administración de antibióticos con actividad contra anaerobios.
- Macrólidos como tratamiento de primera línea si la prevalencia local de resistencia al neumococo es mayor al 75%.
- Iniciar tratamiento combinado con amoxicilina (1 g cada 8 h) + un macrólido o doxiciclina (100 mg cada 12 h).
- Monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria.

42. Paciente femenina de 3 años, acude a la unidad de salud con tos que moviliza secreciones, alza térmica, tiraje intercostal y taquipnea, ambos campos pulmonares y la frecuencia respiratoria está elevada. ¿En qué cifras espera usted encontrar las respiraciones por minuto?

Respuestas:

- Frecuencia respiratoria: 20 o más veces por minuto.
- Frecuencia respiratoria: 30 o más veces por minuto.
- Frecuencia respiratoria: 40 o más veces por minuto.
- Frecuencia respiratoria: 16 o más veces por minuto.

43. Una paciente de 12 años sin antecedentes patológicos importantes consulta a su pediatra por fiebre y dolor articular. En el interrogatorio su madre refiere

como antecedente hace dos semanas tuvo un cuadro de amigdalitis estreptocócica tratado con Amoxicilina 500 mg cada 8 horas por 3 dosis, sin ciclo completo. El día de hoy acude por cuadro de 72 horas de evolución de cefalea frontoparietal que progresa con dolor articular y malestar general, hace 24 horas tiene fiebre. En el examen físico la temperatura es de 38.5°C con dolor articular en rodillas y tobillos, se evidencia presencia de eritema marginado en extremidades superiores e inferiores, a la auscultación cardíaca presencia de soplo cardíaco. En los análisis de laboratorio se evidencia PCR elevada y velocidad de eritrosedimentación elevada, estudio de ecocardiograma con presencia de estenosis de válvula mitral.

Respuestas:

- Fiebre reumática.
- Mononucleosis infecciosa.
- Artritis reumatoide juvenil.
- Infección por Sars cov2.

44. RN de 38 semanas de gestación al medir los signos vitales presenta ausencia de respiración de más de 20 segundos. ¿Cuál es la condición respiratoria?

Respuestas:

- Polipnea.
- Apnea fisiológica.
- Distrés respiratorio.
- Apnea patológica.

45. Paciente femenina de 30 años, antecedentes de Enfermedad de Crohn diagnosticada hace tres años refiere tener mucha sed y visión borrosa. A la valoración de Enfermería paciente asténica, mucosas orales secas, vía central a nivel de subclavia derecha recibiendo nutrición parenteral total (NPT), con: Lípidos 250ml, aminoglucósidos 450ml dextrosa 50% 300ml, obtiene un gasto urinario de 3ml/kg/h. Se realiza exámenes de laboratorio con los siguientes resultados: Na 138 mEq/l, K 3.7 mEq/l, Cl 100 mEq/l, HbA1c 6%. ¿Qué complicación presenta la paciente con relación a la NPT?

Respuestas:

- Hiperglucemia.
- Hipoglucemia de rebote.
- Sobrecarga de líquidos.
- Desequilibrio hidroeléctrico.

46. ¿Qué complicación de la diabetes gestacional ocasiona con mayor frecuencia parto prematuro?

Respuestas:

- Gastropatía.
- Cetoacidosis.

- Nefropatía.
- Preeclampsia.

47. Paciente masculino de 7 años, que acude por presentar tos seca, dificultad respiratoria para el ejercicio, dolor torácico intermitente. Al examen físico, frecuencia respiratoria aumentada, aleteo nasal, retracciones intercostales, sibilancias a la expiración, reducción... de tórax indica hiperinsuflación y engrosamiento peri bronquial. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del paciente?

Respuestas:

- Aspiración de cuerpo extraño.
- Rinosinusitis.
- **Asma bronquial.**
- Reflujo gastroesofágico.

48. En la visita domiciliar programada por el centro de salud se encuentra una casa que no cuentan con sistemas de acueducto y alcantarillado. En la inspección se detecta escasa iluminación y ventilación, así como presencia de roedores. Si tuviera que tomar como referente una teórica en enfermería. ¿Cuál es la indicada para realizar de manera exitosa su trabajo?

Respuestas:

- Hildegard Peplau.
- Patricia Benner.
- **Florence Nightingale.**
- Ida Jean Orlando.

49. Indique el nombre, vía y dosis de la vacuna que dentro del esquema de vacunación del Ecuador se aplica a los recién nacidos sanos durante las primeras 24 horas hasta los 11 meses 29 días.

Respuestas:

- HB, intradérmica, 0.05/1 ml.
- BCG, subcutánea, 0.5 ml.
- HB, intramuscular, 0.5 ml.
- **BCG, intradérmica, 0.05/0.1 ml.**

50. Seleccione las complicaciones agudas de la diabetes:

1. Hipoglucemia.
2. Retinopatía.
3. Cetoacidosis diabética.
4. Nefropatía.
5. Síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico.
6. Neuropatía.

Respuestas:

- 1, 4, 5.
- 2, 4, 6.
- **1, 3, 5.**
- 2, 3, 6

51. Paciente con Diabetes tipo 1, acude a la emergencia por presentar vómitos y deposiciones diarreicas por varias ocasiones, se realiza una glicemia y se evidencia 400 mg/dL. El médico le indica iniciar el tratamiento para Cetoacidosis diabética. ¿Cuál es la intervención de enfermería prioritario en este caso?

Respuestas:

- Administrar volumen de líquidos parenterales.
- Controlar el electrolito Na en pruebas de orina.
- Registrar ingresos en la hidratación del paciente.
- Realizar un electrocardiograma y reportar alteraciones.

52. Las áreas en el cuidado físico del recién nacido son. EXCEPTO:

Respuestas:

- Protección de infecciones y lesiones.
- Mantenimiento de una vía aérea permeable.
- Mantenimiento de una temperatura corporal estable.
- Estimulación para el desarrollo de la motricidad gruesa.

53. Una paciente femenina de 16 años, acude a emergencia por presentar dolor en cuadrante inferior derecho del abdomen de 18 horas de evolución, acompañado de temperatura de 38.1° C y anorexia. Al examen físico se encuentra orientada, febril, normotensa, semihidratada, cardio-pulmonar sin patología aparente, abdomen doloroso difusamente con signo de Blumberg positivo, biometría hemática presenta leucocitosis con neutrófilos elevados. La impresión diagnóstica dada por la apendicitis aguda es complicada. ¿Qué examen de imagen solicitaría para confirmar la impresión diagnóstica en nuestro medio?

Respuestas:

- Tránsito intestinal baritado.
- Resonancia magnética nuclear de abdomen.
- Ecografía abdominal.
- Radiografía simple de abdomen.

54. Mujer de 48 años, casada, nuligesta, sin antecedentes clínicos de importancia, consulta por dolor en mama derecha desde hace 24 horas y además indica que ha notado deformidad en la mama izquierda. A la exploración física se aprecia deformidad a nivel de cuadrante superior externo de la mama izquierda y se palpa una masa de consistencia dura, dolorosa, de bordes irregulares, no móvil, de aproximadamente 14 cm. ¿Qué examen complementario resulta más apropiado en este caso?

Respuestas:

- Ecografía.
- Resonancia magnética.
- Mamografía.
- Rx estándar de tórax.



55. De las siguientes medidas de bioseguridad. ¿Cuál es la más importante en la prevención de las infecciones en las salas de recién nacidos?

Respuestas:

- Lavado quirúrgico de manos.
- Uso de bata y mascarilla.
- Uso de gorro y botas.
- Lavado de manos hasta los codos.

56. ¿A cuál de las opciones corresponde la siguiente definición? "Pérdida de calor corporal mediante el contacto no directo con un objeto muy frío".

Respuestas:

- Radiación.
- Evaporación.
- Conducción.
- Convección.

57. Relacione los tipos de cianosis con sus características:

Riesgo	Factores
1. Central	a. No se observa a nivel bucal ni de mucosas.
	b. La sangre que sale del corazón es de color azul debido a un trastorno en la saturación arterial de oxígeno.
2. Periférica	c. Se observa una coloración azulada y violácea en la piel, labios, mucosas y lecho ungueal.
	d. La coloración azulada y violácea característica se encuentra en la piel de manos y pies y en los lechos ungueales. La piel suele estar fría y húmeda.

Respuestas:

- 1ac, 2bd.
- 1ab, 2cd.
- 1cd, 2ab.
- 1bc, 2ad.

58. La familia Paredes mantiene contacto con el Dr. Basantes, puesto que realiza una visita domiciliaria cada dos semanas. Durante las últimas visitas se ha encontrado diversas irregularidades en el comportamiento del hijo mayor, le ha realizado distintos test y se ha diagnosticado un Trastorno Obsesivo Compulsivo de la Personalidad (TOC). Tras explicar a los miembros familiares (que es, como se trata, que opciones de tratamiento tienen, como sobrellevarlo), se da inicio a la terapia cognitivo Conductual. Esta terapia considera propuesto de los cinco niveles para evaluar el grado en que se



adopta una orientación familiar en la práctica médica. ¿Qué nivel de evolución considera abordar el médico en este caso?

Respuestas:

- Quinto nivel: Terapia familiar.
- Cuarto nivel: evaluación sistemática e intervención planificada.
- Segundo nivel: proporcionar orientación continua y consejos médicos.
- Tercer nivel: Sentimiento y apoyo.

59. En el tratamiento de los ataques de pánico, seleccione el fármaco menos efectivo:

Respuestas:

- Risperidona.
- Alprazolam.
- Fenelzina.
- Fluoxetina.

60. Paciente de 64 años, con antecedentes de litiasis vesicular no operada. Consulta por cuadro de ictericia desde hace 3 meses. ¿Cuál de los exámenes diagnósticos del sistema digestivo está indicado?

Respuestas:

- Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE).
- Laparoscopia.
- Tomografía computarizada (TC).
- Esofagogastroduodenoscopia (EGD).

61. En la valoración de mama de una paciente de 13 años se observa elevación del pezón y aumento de la areola. ¿A qué estadio de Tanner corresponde?

Respuestas:

- Estadio 5.
- Estadio 4.
- Estadio 3.
- Estadio 2.

62. Relacione las vacunas con las vías de administración:

Vacunas	Vías de administración
1. HB	a. Subcutánea
2. OPV	b. Intradérmica
3. FA	c. Oral
4. BCG	d. Intramuscular

Respuestas:

- 1a, 2b, 3d, 4c.
- 1c, 2d, 3b, 4a.
- 1d, 2c, 3a, 4b.
- 1b, 2a, 3c, 4d.

63. De las siguientes opciones, ¿cuál contiene factores de riesgo que predisponen a desarrollar anomalías de inserción placentaria?

Respuestas:

- Edad ≥ 35 años, multiparidad, embarazo múltiple, anemia, cicatriz uterina previa (legrado, aspiración manual uterina, cesárea, miomectomía), tabaquismo, uso de cocaína, espacio intergenésico post cesárea < 12 meses.
- Se debe sospechar de placenta previa en toda mujer embarazada que presente sangrado vaginal con más de 20 semanas de gestación.
- En las gestantes con placenta previa se triplica el riesgo de presentar distocias de situación (oblicua, transversa).
- Los síntomas urinarios y la hemorragia dolorosa proporcionan un alto índice de sospecha de placenta percreta con invasión vesical.

64. Paciente de 46 años, con antecedentes de multiparidad, quien refiere que desde hace un tiempo tiene pérdida involuntaria de orina al estornudar o reírse. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería que se aplica en esta situación?

Respuestas:

- Incontinencia urinaria por rebosamiento r/c obstrucción uretral m/p pérdida involuntaria de pequeñas cantidades de orina.
- Incontinencia urinaria de urgencia r/c disminución de la capacidad vesical m/p pérdida involuntaria de pequeñas cantidades de orina.
- Incontinencia urinaria de esfuerzo r/c debilidad de los músculos pélvicos m/p pérdida involuntaria de pequeñas cantidades de orina.
- Incontinencia urinaria funcional r/c debilidad de las estructuras pélvicas de soporte m/p sensación de necesidad de orinar.

65. ¿Cómo se denomina a la estructura ovárica que da lugar a la liberación del óvulo?

Respuestas:

- Folículo de Graaf.
- Cuerpo lúteo.
- Cuerpo amarillo.
- Cuerpo albicans.

66. ¿Qué componente del Modelo Integral de Salud Familiar Comunitario e Intercultural MAIS-FCI se relaciona con la oferta de los servicios integrales e integrados de salud, garantizando la continuidad en la atención y respondiendo a las necesidades de salud de la población, a nivel individual, familiar y comunitario?

Respuestas:

- Componente de organización.
- Componente de gestión.
- Componente de provisión de servicios.
- Componente de financiamiento.

67. Según prescripción médica le piden administrar Fentanilo 50 microgramos, usted cuenta en el servicio con ampollas de 500 microgramos en 10ml. ¿Cuántos ml debe administrar?

Respuestas:



- 1 ml.
- 10 ml.
- 2 ml.
- 5 ml.

68. Relacione los criterios para el diagnóstico de TB con las recomendaciones que se deben realizar en los adultos:

Criterios para el diagnóstico de TB	Recomendación / característica
1. Criterio clínico	a. Afectados que reciben esquema para TB sensible que continúan con baciloscopia positiva al 2do mes de tratamiento.
2. Criterio bacteriológico	b. Tos con expectoración por más de 15 días con o sin hemoptisis.
3. Criterio epidemiológico	c. Cuando presentan una reacción al PPD igual o mayor en su diámetro a 5 mm.
4. Criterio inmunológico	d. PCR en tiempo real, se debe aplicar a toda persona con sintomatología sugestiva de TB

Respuestas:

- 1a, 2c, 3b, 4d.
- 1d, 2a, 3c, 4b.
- 1b, 2d, 3a, 4c.
- 1c, 2b, 3d, 4a.

69. Todo acto relacionado con el cuidado de la salud debe estar sustentado en el ejercicio de los siguientes principios bioéticos:

Respuestas:

- Principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.
- Principios de individualidad, beneficencia, integridad y justicia.
- Principio de autonomía, beneficencia, misericordia y continuidad.
- Principio de unidad, beneficencia, integridad y no maleficencia.

70. Seleccione el literal correcto en que se enmarca el siguiente enunciado: "Todas las unidades operativas de los tres niveles de atención establecerán mecanismos que permitan el acceso a la asistencia continua, progresiva y gratuita a todas las personas adultas mayores".

Respuestas:

- Proceso continuo asistencial y progresivo del adulto mayor de las normas y protocolo del MSP.
- Objetivo general de las normas y protocolos de atención integral de salud del adulto mayor MSP.
- Normativa general geronto-geriátrica de las normas y protocolos de atención del adulto mayor MSP.

- Independencia y autonomía de las normas y protocolos de atención integral de salud del adulto mayor MSP.

71. Enfermera/o del centro de salud, necesita medir las condiciones de vida familiar y comunitario. ¿Cuáles son las variables que debe usar para medir estas condiciones?

Respuestas:

- Índice de desarrollo humano, distribución de ingresos y medir la pobreza.
- Indicadores sanitarios, medioambientales, sociodemográficos.
- Saber leer y escribir, conocimientos básicos de salud.
- Miembros de la familia, parentesco, riesgo individual, familiar y comunitario.

72. Seleccione las manifestaciones clínicas que corresponden a la pérdida del tono muscular como cambio característico indicativo de muerte clínica inminente: Dificultad para hablar. Pulso más lento y débil. Dificultad para tragar. Incontinencia urinaria. Disminución de la sensibilidad. Disminución de la Presión Arterial.

Respuestas:

- 1, 5, 6.
- 2, 3, 5.
- 1, 3, 4.
- 2, 4, 6.

73. En el tratamiento del dolor oncológico en adultos, de acuerdo con la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud modificada. ¿En qué caso se utiliza tramadol?

Respuestas:

- Escala visual análoga 1- 4.
- Escala visual análoga 5-6.
- Escala visual análoga 7- 9.
- Escala visual análoga 10.

74. ¿Cuáles son los componentes del consentimiento informado? Marque la que NO pertenece.

Respuestas:

- Voluntariedad.
- Capacidad de decisión.
- Información comprensible
- Tecnicismos médicos.

75. Es usted responsable de la gerencia de una maternidad en la sierra centro, en la que busca gestionar recursos ¿Cuál estrategia permite la optimización de la vacuna BCG en recién nacido?

- Para gestionar recursos no se implementa la vacuna BCG ya que se reserva para población con formas graves como Tb meníngea y miliar.



- Vacunar a todos los niños dentro de las primeras 24 horas de nacidos o al primer contacto del niño/a con los servicios de salud, hasta los 11 meses 29 días de edad.
- Utilizar la vacuna únicamente en hijos de madres seropositivas para VIH, que hayan tenido exposición perinatal.
 - En lugar de vacunación, se recomienda iniciar tratamiento antituberculoso con medicamentos en presencia de sintomatología.

76. Profesional en Enfermería al realizar la valoración de la embarazada, obtiene información sobre la paridad de la usuaria que indica que ha tenido dos abortos y dos partos a término. Situación que se cataloga como:

Respuestas:

- Grávida x 2.
- Grávida x 3.
- Grávida x 4.
- Grávida x 5.

77. Usted como coordinador de Enfermería ha detectado que existen algunas diferencias en realizar ciertos procedimientos por el personal a su cargo, para poder solucionar este tema de gestión ha resuelto iniciar un estudio de tiempos y movimientos, como técnica administrativa básica, lo que al terminar podrá decir que toda tarea puede reducirse a movimientos elementales y de esta forma optimizar esfuerzos. ¿Qué autor menciona dicho enfoque?

Respuestas:

- Frederick Taylor.
- Elton Mayo.
- Frank Gilbreth.
- Douglas McGregor.

78. Relacione los términos utilizados en el desarrollo de la enfermería con sus características

Términos	Características
1. Modelo.	a. Conjunto de conceptos interrelacionados que permiten describir, explicar y predecir el fenómeno de interés.
2. Teoría.	b. Conjunto de conceptos globales que identifican los fenómenos particulares de interés para una disciplina.
3. Paradigma.	c. Análisis del concepto y su implicación conceptual en enfermería.
4. Metaparadigma.	d. Conjunto de conceptos que explican de manera general el fenómeno del cuidado.

Respuestas:

- 1a, 2c, 3b, 4d.

- 1d, 2a, 3c, 4b.
- 1b, 2d, 3c, 4a.
- 1c, 2b, 3d, 4a.

79. Acude a la emergencia un varón de 34 años, bebedor ocasional, con antecedente de gastritis por H.Pylori, tratada en dos ocasiones. La última endoscopia fue hace 10 meses. Refiere que tiene accesos de tos desde hace 3 días que la describe entre moderada e intensa, llegando en dos ocasiones a producirle náusea. Hace 48 horas, tuvo una ingesta significativa de alcohol, la cual le ha ocasionado pirosis y náusea. Hace 24 horas, tras un acceso de tos intensa, presentó un vómito sanguinolento. acompañado de dolor retroesternal y epigástrico moderado. Hasta el momento de su ingreso ha presentado cinco vómitos más, todos "con sangre roja" y dos melenas. Al examen físico, se presenta obnubilado, su TA es de 98/62, su pulso está en 138 latidos/minuto, con 24 respiraciones/minuto. Presenta signos de irritación de la garganta. La exploración torácica no revela signos patológicos, no así el abdomen, que presenta dolor durante la palpación superficial y profunda de la región meso y epigástrica. Considerando la información del caso, usted diagnostica una hemorragia digestiva alta por un desgarro de Mallory-Weiss. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- Solicitar una colonoscopia para determinar el origen de las melenas.
- Se recomienda una endoscopia digestiva para colocación de clips.
- Por su alteración hemodinámica, es necesario una cirugía urgente.
- Realizar inmediatamente un aspirado gástrico y lavados con suero frío.

80. Señale los signos y síntomas que pertenezcan a la enfermedad por reflujo gastroesofágico en paciente pediátrico

1. Disfagia.
2. Artralgia.
3. Regurgitación recurrente con o sin vómito.
4. Pérdida o escasa ganancia de peso.

Respuestas:

- 1,2,4.
- 1,3,4.
- 2,3,4.
- 1,2,3.

81. Una mujer de 46 años acude a la emergencia por presentar un cuadro de dolor abdominal en el cuadrante superior derecho del abdomen: La paciente conoce que tiene cálculos biliares por cuanto ha sido evaluada por ultrasonido en dos ocasiones anteriores en el último año por dolores cólicos en el hipocondrio derecho. Esta vez el dolor es continuo y se ha acompañado de vómito por dos ocasiones sin que se modifique el dolor. Los signos vitales muestran T: 37,8° C. FC, 92 lpm; TA:130/80 mm Hg; FR: 18 rpm. Un ultrasonido del abdomen muestra cálculos en la vesícula, líquido alrededor de la misma y

un grosor de la pared de 9 milímetros. ¿Cuál de los siguientes signos es el más típico que esta paciente presentaba en el examen físico del abdomen?

Respuestas:

- Psoas.
- Blumberg.
- Rovsing.
- **Murphy.**

82. En un paciente con diagnóstico de laringotraqueobronquitis moderada. ¿Cuál es el esquema de tratamiento adecuado?

Respuestas:

- Control de la vía aérea - budesónida inhalada - salbutamol inhalada.
- Control de la vía aérea - prednisolona oral - amoxicilina oral.
- **Control de la vía aérea - adrenalina racémica nebulizada - dexametasona oral.**
- Control de la vía aérea - adrenalina nebulizada - cetirizina oral.

83. Paciente de 35 años, es llevado a emergencias por opresión centro torácica, palpitaciones y diaforesis de 2 horas de duración, en relación a la ingesta de alcohol y cocaína. ¿Qué alteración se objetiva en el electrocardiograma descrito a continuación?

Respuestas:

- Taquicardia supraventricular.
- **Taquicardia ventricular polimorfa.**
- Taquicardia ventricular monomorfa.
- Fibrilación ventricular.

84. Un paciente de 21 años sin antecedentes clínicos de importancia, presenta un cuadro compatible con neumonía comunitaria y decide hospitalizar. Tres días más tarde, con adecuada evolución clínica, usted solicita una radiografía de tórax para control previo al alta, pero todavía persiste el infiltrado radiológico. En estas condiciones y expresado en semanas, usualmente. ¿Cuál es el mínimo tiempo promedio en que se realiza el control radiológico?

Respuestas:

- 1 semanas.
- 2 semanas.
- 3 semanas.
- **6 semanas.**

85. Cuando la paciente embarazada se encuentra acostada durante la toma de la tensión arterial en la posición decúbito supino se puede provocar hipotensión a causa de compresión venosa. ¿Cuál de las siguientes venas es más probable que hayan sufrido compresión?

Respuestas:

- Vena femoral.
- **Vena Cava Inferior.**
- Vena Porta Hepática.



- Vena cava superior.

86. La enfermera del centro de salud, valora a un lactante para evaluar la pertinencia y adecuación de sus habilidades. Evidencia que cuando está boca abajo, levanta la cabeza y el pecho, y soporta el peso con los antebrazos. En el desarrollo del motor grueso ¿A qué edad del lactante corresponde esta habilidad?

Respuestas:

- De 2 a 4 meses.
- De 4 a 6 meses.
- De 6 a 8 meses.
- De 8 a 10 meses.

87. Con relación a los cuidados para el manejo adecuado de las náuseas y vómitos en personas en la fase final de la vida. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones permite disminuir estas molestias?

Respuestas:

- Brindar infusiones durante las comidas.
- Preferir dieta líquida, fraccionada.
- Iniciar el día con alimentos secos como tostadas o galletas de sal.
- Suministrar bebidas de canela, menta, laurel y jengibre.

88. Paciente de 70 años permanece en reposo absoluto por diagnóstico de prótesis total de cadera, al realizar medidas de higiene y confort se observa en región sacra una úlcera de presión grado III. ¿Cuál es la principal característica que presenta este estadio?

Respuestas:

- Pérdida completa del espesor de piel grasa visible.
- Pérdida parcial del espesor de piel aparición de ampolla.
- Piel íntegra con eritema no blanqueante.
- Pérdida completa del espesor de los tejidos.

89. Paciente femenina de 43 años hospitalizada alrededor de 3 meses presenta antecedentes patológicos cáncer de mama estadio IIIB hace 3 años y recibe tratamiento con radioterapia y quimioterapia. Actualmente presenta metástasis ósea. Familiar refiere que ha sido seleccionada para participar en un estudio experimental en Boston, en el cual, recibirá como tratamiento terapia hormonal y a su vez se le brindará cuidados paliativos. La evolución en los tratamientos oncológicos involucra nuevos problemas éticos, uno de esos podría ser el conflicto de interés. La bioética se desarrolla con el fin de resolver problemas éticos que se presentan en diferentes cambios en diferentes ámbitos.

Respuestas:

- Cambios en la medicina.
- Cambios en la política.
- Cambios culturales.
- Cambios en la ciencia.

90. Paciente que presencié un accidente de tránsito, presentando posteriormente sueños con recuerdos angustiosos, permanece irritable, ocasionalmente presenta arrebatos de furia y no muestra interés en participar en diferentes actividades familiares. Señale el tipo de trastorno:

Respuestas:

- De ataques de pánico.
- De estrés postraumático.
- De obsesión-compulsión.
- De ánimo deprimido.

91. A la auscultación abdominal el profesional en enfermería detecta ruidos hipoactivos muy suaves. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede ser la causa de esta manifestación clínica?

Respuestas:

- Uso de laxantes.
- Deposiciones diarreicas.
- Intolerancia a los alimentos.
- Manipulación del intestino durante la cirugía.

92. El familiar de un adulto mayor le pregunta al profesional en Enfermería que hacer con su paciente que tiene Alzheimer, porque le preocupa que la estancia en la casa pueda provocarle complicaciones. ¿Cuáles son las principales complicaciones de un paciente con Alzheimer?

Respuestas:

- Lesiones, neumonía, estreñimiento, desnutrición, depresión, deshidratación.
- Diarreas, ansiedad, hiperactividad, delirios, aspiración, neumotórax.
- Derrame pleural, neumonía, fístulas broncopulmonares, insuficiencia respiratoria.
- Temblor, músculos rígidos, cambios en el habla, postura y equilibrios alterados.

93. ¿Cuál es el esquema de administración correcto para la suplementación con hierro más ácido fólico a embarazadas y madres lactantes?

Respuestas:

- Una tableta diaria inmediatamente después de las comidas.
- Una tableta diaria 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.
- Una tableta diaria de lunes a viernes de preferencia con jugos cítricos.
- Una tableta diaria junto con las comidas con un vaso de agua pura o jugo.

94. Existen varios test para la determinación de la edad gestacional de un recién nacido. EXCEPTO:

Respuestas:

- Test de Capurro Somático y Somato-Neurológico.
- Test de maduración Neuromuscular de Ballard.
- Test de Farr y Dubowitz.

- Test de Silverman-Andersen.

95. ¿Cuál es la mejor opción para proteger del contagio de la hepatitis B al personal de salud?

Respuestas:

- Aplicar vacuna anti hepatitis B según el esquema establecido por el M.S.P.
- Aplicar medidas de asepsia, especialmente el lavado de manos.
- Recibir dosis suficiente de gamaglobulina.
- Utilizar jeringuillas descartables para cada paciente.

96. Las siguientes son complicaciones del tercer trimestre del embarazo.

EXCEPTO:

Respuestas:

- Amenaza de aborto.
- Embarazo ectópico.
- Preeclampsia leve.
- Enfermedad del trofoblasto.

97. La aspiración de secreciones por traqueostomía es un procedimiento básico del cuidado enfermero en pacientes adultos y adultos mayores con patologías respiratorias. ¿Cuál es la primera actividad que debe realizar de acuerdo a prioridad?

Respuestas:

- Ventilar al paciente con la bolsa manual de reanimación y flujo alto de oxígeno por 30 s aproximadamente.
- Aplicar aspiración en tanto se retira y gira en forma cuidadosa el catéter 360 grados (no más de 10 a 15 s).
- Observar cantidad, color, olor y consistencia de las secreciones aspiradas para registrarlas en la historia clínica.
- Explorar los ruidos pulmonares del paciente y la saturación de oxígeno mediante oxímetro de pulso.

98. Un paciente varón de 72 años con antecedentes de alcoholismo crónico y cirrosis. Acude a emergencias por decaimiento, fiebre y dolor abdominal de 2 días de evolución. Al examen físico, lo relevante es la temperatura de 38.8 grados centígrados y frecuencia cardíaca 100 lpm (latidos por minuto) y presencia de ascitis, con dolor difuso a la palpación abdominal y peritonismo. La tomografía descarta compromiso visceral abdominal. La punción peritoneal reporta líquido con 300 polimorfonucleares por microlitro. Entre los siguientes gérmenes. ¿Cuál NO está implicado habitualmente en la etiología de este cuadro?

- Estreptococo.
- Anaerobios.
- Estafilococo.
- Enterobacterias.



99. Paciente de 78 años, acude al centro de salud, con antecedentes de artritis reumatoidea diagnosticada hace 5 años, refiere intenso dolor en manos. Al examen físico paciente presenta edema a nivel de falanges, eritema, aumento de la temperatura corporal y limitación en la articulación de manos. Por prescripción médica la enfermera administra Tramadol 100 mg y metoclopramida 10 mg, y se recomienda a la paciente continuar con las prescripciones médicas Indicadas. ¿De acuerdo a la evidencia cuál sería el tratamiento inicial para esta paciente?

Respuestas:

- Uso de antiinflamatorios no esteroides, (aines) corticoides.
- Uso de técnicas de neuro modulación o métodos ablativos como la estimulación nerviosa transcutánea.
- Uso de opioides débiles, inyectar ácido hialurónico en las articulaciones o plasma rico en plaquetas.
- Uso de compresas frías para generar una vasodilatación directa.

100. Seleccione los factores de riesgo laboral durante el embarazo:

- a. Movimiento fetales, con presencia de tapón mucoso.
- b. Posición de pie por tiempo prolongado (más de tres horas).
- c. Esfuerzo físico excesivo, puede provocar daño al feto.
- d. Control insuficiente prenatal, tres visitas y una última a las 20 semanas.
- e. Exposición de agentes físicos, químicos y biológicos.
- f. Levantar objetos pesados constituye un esfuerzo físico.

Respuestas:

- a, c, e, f.
- c, d, a, e.
- b, c, e, f.
- a, b, c, d.

101. ¿Cuál es la vía de administración habitual de la heparina según el caso presentado?

Respuestas:

- Vía intravenosa.
- Vía intradérmica.
- Vía subcutánea.
- Vía intramuscular.

102. ¿Qué etapa del puerperio abarca el tiempo desde el segundo día del nacimiento hasta los 10 días de postparto?

Respuestas:

- Puerperio inmediato.
- Puerperio normal.
- Puerperio mediato.
- Puerperio tardío.



103. ¿Cuáles son los síntomas fundamentales de la esquizofrenia según el DSM 5?

Respuestas:

- Acumulación, delirio bizarro y atracones.
- Delirios, alucinaciones y habla desorganizada.
- Ilusiones, pensamientos erróneos y tristeza.
- Catatonia, Verborrea e ilusiones.

104. ¿Cuál sería el tratamiento inicial recomendado para una paciente con artritis reumatoidea y dolor intenso en las manos?

Respuestas:

- Uso de compresas frías para generar una vasodilatación directa.
- Uso de Antiinflamatorios no esteroides (AINES) corticoides.
- Uso de técnicas de neuro modulación o métodos ablativos como la estimulación nerviosa transcutánea.
- El uso de opioides débiles, inyectar ácido hialurónico en la articulaciones o plasma rico en plaquetas.

105. Complete el enunciado: Hombre de 27 años con infección estafilocócica en piel, requiere aislamiento _____ con uso de _____ y batas desechables.

Respuestas:

- por gotas – mascarilla común.
- de contacto – mascarilla N95.
- por aire – guantes.
- de contacto – guantes.

106. La gasometría arterial se realiza para valorar el equilibrio ácido básico del paciente y su oxigenación. Relacione la alteración ácido básica con los valores de la gasometría arterial que correspondan:

Alteración ácido básica	Valores de la gasometría arterial
1. Acidosis respiratoria	a. pH <7.35 PaCO ₂ Normal; o <35 mm Hg con compensación respiratoria HCO ₃ <22 mEq/L.
2. Alcalosis respiratoria	b. pH >7,45 PaCO ₂ <35 mm Hg HCO ₃ Normal; o <22 mEq/L con compensación renal.
3. Acidosis metabólica	c. pH <7.35 PaCO ₂ >45 mm Hg HCO ₃ Normal; o >26 mEq/L con compensación renal.
4. Alcalosis metabólica	d. pH >7,45 PaCO ₂ Normal; o >45 mm Hg con compensación respiratoria HCO ₃ >26 mEq/L.

Respuestas:



- 1a, 2b, 3c, 4d.
- 1c, 2b, 3a, 4d.
- 1d, 2c, 3b, 4a.
- 1b, 2a, 3d, 4c.

107. En relación a los métodos de diagnóstico del VIH-SIDA, complete el siguiente enunciado: La prueba de laboratorio que determina la presencia de anticuerpos contra VIH en la sangre es _____ y los resultados positivos se validan con la prueba _____.

Respuestas:

- ELISA – Western blot.
- Carga viral – Antígeno p24.
- ELISA – Carga viral.
- Western blot – Antígeno p24.

108. Seleccione las etapas de la vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas con la atención de salud (IAAS):

1. Definiciones de hechos a vigilar.
2. Programas de supervisión.
3. Recolección de datos.
4. Consolidación y análisis de datos.
5. Programas de prevención.
6. Capacitación al personal.
7. Divulgación de los resultados.

Respuestas:

- 2, 4, 5, 6.
- 2, 3, 5, 6.
- 1, 2, 6, 7.
- 1, 3, 4, 7.

109. Usted asiste a un parto en compañía del médico, se obtiene un producto vivo de sexo masculino de 30 semanas de gestación, presencia de líquido claro; mientras se espera la transferencia se observa: taquipnea, aleteo nasal, retracciones intercostales y quejido audible. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos corresponde a esta sintomatología?

Respuestas:

- Enfermedad de membrana hialina.
- Hipertensión pulmonar persistente.
- Síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial.
- Neumonía neonatal.

110. Con relación al procedimiento de ventilación de rescate para adultos; en una situación en la que: la víctima no responde, tiene pulso, pero no respira. Con este antecedente, complete el siguiente enunciado. Realice _____ cada _____. Cada ventilación debe durar aproximadamente 1 segundo, en la que el tórax debe elevarse visiblemente. Compruebe el pulso cada _____.



Respuestas:

- 2 ventilaciones - 8 a 10 segundos - minuto.
- 1 ventilación - 3 a 5 segundos - 2 minutos.
- 1 ventilación - 5 a 6 segundos - 2 minutos.
- 2 ventilaciones - 7 a 8 segundos - minuto.

111. Relacione la ubicación de la colostomía con la naturaleza de la descarga que corresponda.

Ubicación de la colostomía	Naturaleza de la descarga
1. Sigmoidea.	a. Las heces son líquidas.
2. Descendente.	b. Las heces no están formadas.
3. Transversa.	c. Las heces están semiformadas.
4. Ascendente.	d. Las heces están formadas.

Respuestas:

- 1d, 2c, 3b, 4a.
- 1d, 2b, 3a, 4c.
- 1a, 2b, 3c, 4d.
- 1b, 2a, 3c, 4d.

112. Con relación a las vías de administración de medicamentos complete el siguiente enunciado: La vía _____ se utiliza para _____. La aguja entra en la piel con un ángulo de _____.

Respuestas:

- Subcutánea – administrar heparina – 5°-15°.
- Intradérmica – administrar insulina – 45° o 90°.
- Subcutánea – realizar pruebas de alergia – 45° o 90°.
- Intradérmica – hacer pruebas de alergia – 5°-15°.

113. Seleccione los focos de auscultación cardíaca en el examen físico:

- a. aórtico.
- b. endocárdico.
- c. pulmonar.
- d. tricúspide.
- e. pericárdico.
- f. mitral.

Respuestas:

- a, c, b, f.
- e, f, b, c.
- a, c, d, f.
- b, e, d, f.

114. Usted aplica medidas de confort en el paciente encamado con una hemiplejía del lado izquierdo con músculos espásticos. ¿Qué ejercicios usted realiza al paciente?

Respuestas:



- Ejercicios de reeducación muscular.
- Relajación muscular y cambios posturales.
- Ejercicios activos de músculos.
- Ejercicios de resistencia muscular.

115. Al realizar la visita domiciliaria a paciente en estadio terminal de cáncer, usted identifica algunos cambios que le sirven para diagnosticar duelo anticipado. Relacione los indicadores con los cambios que corresponden:

Indicador	Cambios
1- Fisiológicos	a. Cambios en el apetito.
	b. Movimientos lentos.
2- Conductuales	c. Trastornos del sueño.
	d. Olvidos frecuentes.

Respuestas:

- 1cd, 2ab.
- 1ac, 2bd.
- 1bc, 2ad.
- 1ab, 2cd.

116. La señora NN acude al establecimiento de salud donde usted trabaja, ella es primigesta y cursa con 38 semanas 5 días de gestación, a la valoración obstétrica la actividad uterina es regular: una contracción de 30 segundos de duración cada 20 minutos, de + de intensidad; al tacto vaginal se encuentra con 2 centímetros de dilatación y 70% de borramiento; presenta una descarga vaginal mucoide ligera con pintas de sangre. Se encuentra tranquila, aunque cuando vienen las contracciones se emociona y lo manifiesta. Según los datos valorados elija la fase de la labor de parto que la paciente atraviesa:

Respuestas:

- Fase latente.
- Fase de pródromos.
- Fase de transición.
- Fase activa.

117. Un recién nacido tiene 20 horas de vida y nació a término con peso adecuado para la edad gestacional. Su grupo sanguíneo es ARH+ y es hijo de una madre ORH+. Al momento se encuentra con ictericia en zona 2 según la escala de Kramer y presenta Bilirrubinas totales de 15mg/dl a expensas de la bilirrubina indirecta. El resto del examen físico del recién nacido es normal. ¿Cuál es la probable complicación del niño?

Respuestas:

- Ictericia por incompatibilidad ABO.
- Ictericia multifactorial.
- Ictericia por incompatibilidad de factor.
- Ictericia fisiológica.

118. Los impulsos eléctricos cardíacos nacen en el nódulo sinusal para luego pasar al nódulo aurículo-ventricular. Desde allí se continúa la transmisión a través de:

Respuestas:

- Red de Purkinje.
- Haz de Hiss.
- Conjunto de células denominadas "P".
- Nódulo ventricular.

119. Las vacunas virales atenuadas al ingresar al organismo de un niño son capaces de producir una respuesta inmunológica sin causar daño; sin embargo, en algunos casos puede presentar complicaciones graves como:

Respuestas:

- Encefalitis, sordera.
- Malestar general, sordera.
- Cefalea, meningitis.
- Dolor local, convulsiones.

120. Seleccione las recomendaciones para la transfusión de componentes en hemorragia masiva:

1. Transfundir concentrado de glóbulos rojos cuando se estime una pérdida de la volemia que supere el 30%.
2. Utilizar equipos de presión externa con accesos venosos de pequeño diámetro.
3. Prevenir hipotermia.
4. Completar la transfusión sanguínea en un tiempo máximo de ocho horas desde su colocación.
5. Administrar cristaloides como primera línea de tratamiento para corregir el déficit de volumen.
6. Tomar y registrar los signos vitales del paciente luego de treinta minutos del inicio de la transfusión.

Respuestas:

- 1, 4, 6.
- 2, 3, 6.
- 1, 3, 5.
- 2, 4, 5.

121. Para evitar errores en el registro de la administración de la medicación es importante que en la historia clínica del paciente se registre la aplicación del medicamento. ¿Qué datos deben constar en este registro?

Respuestas:

- Nombre del medicamento, acción correcta, forma correcta, respuesta correcta.
- Nombre del medicamento, paciente correcto, dosis, iniciales de la persona que administra.



- Nombre de medicamento, dosis, vía, hora, forma correcta, paciente correcto.
- Nombre del medicamento, dosis, hora, vía, iniciales de la persona que administra.

122. El tratamiento inicial de pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en estadio moderado, se basa en un plan terapéutico que incluye:

Respuestas:

- Broncodilatadores inhalados y oxígeno suplementario.
- Analgésicos y oxígeno por ventilación no invasiva.
- Anticolinérgicos y oxígeno suplementario.
- Corticoesteroides y oxígeno por ventilación no invasiva.

123. Relacione los tipos de cianosis con sus características:

Riesgo	Factores
1. Central	a. No se observa a nivel bucal ni de mucosas.
	b. La sangre que sale del corazón es de color azul debido a un trastorno en la saturación arterial de oxígeno.
2. Periférica	c. Se observa una coloración azulada y violácea en la piel, labios, mucosas y lecho ungueal.
	d. La coloración azulada y violácea característica se encuentra en la piel de manos y pies y en los lechos ungueales. La piel suele estar fría y húmeda.

Respuestas:

- 1ac, 2bd.
- 1bc, 2ad.
- 1ab, 2cd.
- 1cd, 2ab.

124. Son derechos humanos universales la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todas las personas, están relacionados entre sí y coexisten en la vida de los seres humanos en sus cuerpos y mentes. ¿A qué enfoque corresponde?

Respuestas:

- Enfoque de igualdad.
- Enfoque de género.
- Enfoque de sexualidad integral.
- Enfoque de derechos sexuales y reproductivos.



125. Atendiendo los cambios fisiológicos, funcionales y cognitivos que suceden en el proceso de envejecimiento. Relacione los cambios fisiológicos que se producen en los sistemas del organismo del adulto mayor:

Sistema	Cambios fisiológicos
1. Tegumentario	a. Engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos, pérdida de la elasticidad de los vasos, aumento de la presión arterial, disminución de la circulación periférica.
2. Cardiovascular	b. Pérdida de la elasticidad de la piel, cambios en la pigmentación, caída del pelo, atrofia de las arteriolas epidérmicas.
3. Gastrointestinal	c. Disminución de la masa y fuerza muscular, descalcificación ósea, cambios degenerativos de las articulaciones, deshidratación de los discos intervertebrales.
4. Musculo esquelético	d. Enfermedad periodontal, atrofia de las glándulas salivales, reducción de la motilidad, disminución de la musculatura lisa, dificultad de masticación y deglución.

Respuestas:

- 1a, 2b, 3c, 4d.
- 1c, 2a, 3d, 4b.
- 1d, 2c, 3a, 4b.
- 1b, 2a, 3d, 4c.

126. Señale los métodos anticonceptivos conocidos como temporales:

Respuestas:

- Pastilla del día después, implantes, vasectomía.
- Espumas espermicidas, ligadura, método de Billings.
- Preservativo, dispositivo intrauterino (DIU), píldora anticonceptiva.
- Histerectomía, temperatura basal, método MELA.

127. Relacione el tipo de sistema de administración de O₂ con los dispositivos que correspondan:

Sistema	Dispositivos
1- Bajo flujo	a) Collar de traqueostomía
	b) Cánula nasal
2- Alto flujo	c) Mascarilla simple
	d) Pieza en T

Respuestas:

- 1ac, 2bd.
- 1ab, 2cd.

- 1bc, 2ad.
- 1cd, 2ab.

128. Con relación a los atributos de la vigilancia epidemiológica. ¿Cuál se refiere a la rapidez con la cual se obtiene, analiza y reporta la información?

Respuestas:

- Sensibilidad.
- Simplicidad.
- Oportunidad.
- Flexibilidad.

129. Un hombre de 41 años, con talla de 1.75 m y un peso de 72.0 kg. De acuerdo al Índice de Masa Corporal (IMC). ¿Qué estado nutricional tiene?

Respuestas:

- Deficiente.
- Sobrepeso.
- Normal.
- Obesidad.

130. Paciente joven de 23 años, a 6 días de cumplir las 20 semanas de gestación de un embarazo normal acude a centro de vacunación, solicita información a enfermería sobre las vacunas que requiere durante esta etapa, ¿Cuál es la inmunización que debe aplicar?

Respuestas:

Profilaxis anti-D.

Influenza H1N1.

Antitoxina tetánica.

Rubeola.

131. Recién nacido masculino permanece en alojamiento conjunto con la madre en la sala de parto, durante la atención de enfermería se realiza antropometría, recibe la profilaxis ocular y con vitamina K y se inicia lactancia materna. ¿Qué artículo de la Ley Orgánica sustentan estas actividades?

Respuestas:

- Artículo 6.
- Artículo 12.
- Artículo 69.
- Artículo 14.

132. Los pacientes sometidos a quimioterapia habitualmente refieren “sabor metálico” de los alimentos. ¿Cuál es la medida para disminuir esta alteración del gusto?

Respuestas:

- Comidas picantes, porque disminuyen esta sensación.
- Cepillado bucal en forma vigorosa y enjuagarse frecuentemente.
- Restringir el consumo de alimentos tibios.
- Restringir el consumo de carnes rojas.

133. ¿Cuál es el objetivo de la aplicación del test de APGAR familiar?

- Determinar una crisis familiar normativa.
- Evaluar el Nivel de funcionamiento de la familia.
- Evaluar la capacidad de la familia para cumplir sus funciones.
- Determinar una crisis familiar no normativa.

134. Al nacimiento del recién nacido se producen adaptaciones de los diferentes sistemas orgánicos. Seleccione los cambios en el sistema cardiovascular que ayudan a la transición desde la circulación fetal a la posnatal:

- a. Cierre del foramen oval.
- b. Persistencia del conducto arterioso.
- c. Cierre del conducto venoso.
- d. Descenso del volumen sanguíneo.
- e. Cierre del conducto arterioso.

Respuestas:

- a, d, e.
- b, c, e.
- a, b, d.
- a, c, e.

135. Relacione el grupo químico del desinfectante con el mecanismo de acción que corresponda.

Grupo químico	Mecanismo de acción
1. Alcoholes.	a. Inhibición de reacciones enzimáticas
2. Liberadores de cloro.	b. Precipitación y desnaturalización de proteínas
3. Aldehídos.	c. Inactivación de enzimas productoras de energía.
4. Compuestos de amonio cuaternario.	d. Alteración en el ADN, ARN y la síntesis de proteínas.

Respuestas:

- 1b, 2a, 3d, 4c.
- 1c, 2d, 3a, 4b.
- 1a, 2b, 3c, 4d.
- 1d, 2c, 3b, 4a.

136. Usted como profesional de enfermería debe verificar el tipo de vacunas que aplicará a los niños menores de 5 años. Relacione los tipos de vacuna y sus características:

Tipo de vacuna	Características
1. Vacuna viva (atenuada)	a. Contiene un solo tipo antigénico.
2. Vacuna inactivada	b. Induce respuesta celular y humoral.
	c. Escaso estímulo de inmunidad celular.

	d. Puede provocar la enfermedad en el individuo.
	e. No provoca la enfermedad en el individuo.
3. Vacuna monovalente	f. Antígeno de una misma especie microbiana.

Respuestas:

- 1ab, 2cd, 3ef.
- 1bd, 2ce, 3af.
- 1cd, 2ef, 3ab.
- 1ef, 2ab, 3cd.

137. Según la clasificación de severidad clínica en el embarazo, ¿en qué parámetros de hemoglobina existe anemia moderada?

Respuestas:

- 7.1 g/dl – 10.0 g/dl
- 10.1 g/dl – 10.9 g/dl
- Menor de 7.1 g/dl
- Mayor de 11 g/dl

138. Los siguientes son enfoques del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS-FCI). EXCEPTO:

Respuestas:

- Interculturalidad, salud mental.
- Investigación, cuidados paliativos.
- Intervención intersectorial, movilización de recursos.
- Atención Primaria de Salud Renovada, epidemiología comunitaria.

139. En un colegio de 800 alumnos de su área de influencia, después de asistir a un almuerzo por el día de la familia donde participaron 150 estudiantes y 50 profesores, se presentan 25 casos de infección por salmonelosis. Identifique el nivel de riesgo de enfermarse a través del cálculo de la tasa de ataque:

Respuestas:

- 3.12 %.
- 12.5% .
- 25%.
- 16.6 %.

140. Las siguientes son recomendaciones que se debe tomar para el lavado de manos. EXCEPTO:

Respuestas:

- Tiempo aproximado de 40 - 60 segundos.
- Retirar las joyas y el reloj.
- Utilizar toalla de tela.
- Fricción mecánica de las manos.



141. Complete el enunciado: A un paciente de 57 años con tensión muscular en la región lumbar, se le aplica una compresa _____ porque promueve la _____ muscular y reduce el dolor de los espasmos y rigidez.

Respuestas:

- caliente – relajación.
- fría – vasoconstricción.
- caliente – vasodilatación.
- tibia – relajación.

142. Para el uso del preservativo masculino se toma en cuenta ciertas condiciones, EXCEPTO:

Respuestas:

- Antes de ponerse no se debe desenrollar el condón.
- Debe ser colocado en el pene erecto.
- Debe ser colocado justo antes de eyacular.
- Tiene una efectividad de hasta el 97% utilizado adecuadamente.

143. En la estrategia Score mamá (kit azul) se indica el uso de Betametasona o Dexametasona para:

- Hemorragia postparto.
- Maduración fetal.
- Terapia antihipertensiva.
- Toxicidad por Sulfato de Magnesio.

144. Un niño de 4 meses de edad, llega al servicio de vacunación con su madre, debe recibir la vacuna de fIPV y a la vez colocarse otras vacunas inyectables según el esquema de vacunación del MSP del Ecuador. Seleccione el orden de administración:

1. La pentavalente cara anterolateral del muslo.
2. La fIPV (hombro izquierdo).
3. Neumococo (muslo).
4. Rotavirus (boca).

Respuestas:

- 2, 1, 3, 4.
- 2, 4, 1, 3.
- 4, 2, 3, 1.
- 4, 1, 2, 3.

145. En un paciente con cáncer de próstata y diagnóstico de enfermería: Retención urinaria R/C obstrucción uretral secundaria a crecimiento del tumor prostático M/P distensión vesical. Relacione las intervenciones de enfermería con el principio científico que corresponda.

Intervenciones de enfermería	Principio científico
1. Determinar el patrón funcional urinario usual del paciente.	a. Facilita conocer la cantidad de orina que permanece en la vejiga después de la micción.



2. Buscar los signos y síntomas de retención urinaria.	b. Es necesario para prevenir infecciones.
3. Colocar una sonda para medir el volumen de orina residual.	c. Un egreso menor a los ingresos constituye un elemento de sospecha.
4. Mantener la esterilidad del sistema cerrado.	d. Proporciona datos basales para comparar y un objetivo al cual regresar.

Respuestas:

- 1a, 2c, 3d, 4b.
- 1c, 2d, 3a, 4b.
- 1b, 2a, 3c, 4d.
- 1d, 2c, 3a, 4b.

146. La OMS a través de una lista de verificación planteó tres etapas de revisión en el proceso quirúrgico. Seleccione y ordene en secuencia lógica las etapas de control de la cirugía segura:

1. Después de la programación quirúrgica.
2. Antes de la esterilización de materiales.
3. Antes de la inducción de la anestesia.
4. Después de la provisión de equipamiento.
5. Antes de la incisión cutánea.
6. Antes de que salga del quirófano.
7. Después de la preparación del paciente.

Respuestas:

- 1, 2, 4
- 2, 4, 5
- 3, 4, 7
- 3, 5, 6

147. Complete el enunciado: Uno de los criterios para el diagnóstico de la Diabetes Mellitus es presentar síntomas diabéticos como _____ y pérdida de peso no explicada, además tener concentraciones de glucosa plasmática equivalente o mayor a _____ en cualquier hora del día sin tomar en consideración el tiempo transcurrido desde la última comida.

Respuestas:

- policitemia – poliuria – 126 mg/dL (7,0 mmol/L).
- poliuria – polidipsia – 200 mg/dL (11,1 mmol/L).
- poliuria – polidipsia – 126 mg/dL (7,0 mmol/L).
- policitemia – poliuria – 200 mg/dL (11,1 mmol/L).

148. El recién nacido tiene una innata preferencia por el rostro humano, esta es una condición que explica la alineación de la mirada con la madre durante el amamantamiento. ¿Cuál es la distancia entre la alineación de la mirada y el objeto?

Respuestas:

- 40 a 50 cm.
- 25 a 30 cm.
- 0 a 20 cm.
- 30 a 40 cm.

149. Según el Principialismo: ¿Cuáles son los 4 principios fundamentales de la Bioética?

- Veracidad, Tolerancia, Autonomía, Beneficencia.
- Fidelidad, Tolerancia, Beneficencia y No Maleficencia.
- Confiabilidad, Solidaridad, Autonomía y Beneficencia.
- Beneficencia, No Maleficencia, Justicia y Autonomía.

150. Una madre puérpera llega al Centro de Salud a los 10 días de haber dado a luz, es atendida por el profesional de enfermería quien brinda consejería a la usuaria. Seleccione los aspectos que se espera encontrar en la valoración de la usuaria en esta etapa del puerperio:

1. Loquios serohemáticos.
2. Útero no palpable.
3. Involución uterina entre la sínfisis del pubis y la cicatriz umbilical.
4. Loquios serosos.
5. Leucocitosis.
6. Aumento de lactógeno placentario humano.

Respuestas:

- 1, 2, 6.
- 1, 3, 5.
- 3, 4, 6.
- 2, 4, 5.

151. Calcule el gasto cardíaco de un adulto en reposo que tiene una frecuencia cardíaca (FC) de 70 latidos por minuto.

Respuestas:

- 5.4 L/min.
- 4.9 L/min.
- 5.7 L/min.
- 4.2 L/min.

152. Seleccione las pruebas estadísticas descriptivas utilizadas para la tabulación y análisis de datos cuantitativos obtenidos de una investigación:

1. Regresión lineal.
2. Chi cuadrado.
3. Moda.
4. Prueba T.
5. Mediana.
6. Desviación Estándar.
7. Varianza.
8. Correlación.

Respuestas:

- 3, 5, 6, 7.
- 1, 2, 7, 8.
- 1, 3, 5, 7.
- 3, 4, 5, 8.

153. En una casa de salud se produce un parto prematuro moderado. De acuerdo con la Guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador ¿a qué edad gestacional pertenece esta clasificación?

Respuestas:

- 34 a 36 semanas 6 días de gestación.
- 28 a 31 semanas 6 días de gestación.
- 32 a 33 semanas 6 días de gestación.
- Menor o igual a 27 semanas 6 días de gestación.

154. Relacione los tipos de soluciones con la concentración para la administración.

Solución	Concentración
1. Dextrosa al 5% en agua	a. Hipertónica
2. Dextrosa al 10% en agua	b. Hipotónica
3. Solución Salina 0.45%	c. Isotónica

Respuestas:

- 1c, 2a, 3b.
- 1b, 2a, 3c.
- 1a, 2c, 3b.
- 1a, 2b, 3c.

155. La prueba del sudor (ionotest) es la que determina la cantidad de cloro en una muestra de sudor siendo positiva cuando el cloro se encuentra elevado. ¿Qué diagnóstico confirma?

Respuestas:

- Epiglotitis.
- Asma.
- Fibrosis quística.
- Neumonía.

156. ¿Cuáles son las características del exantema de la enfermedad de Kawasaki?

Respuestas:

- Maculopapular, descendente, confluyente.
- Maculopápulas, morbiliforme, urticariforme.
- Maculopápulas en el tronco.
- Niño abofeteado, maculopápulas en el tronco.

157. ¿Cuál es la dosis recomendada para prevenir el síndrome de hemorragia por déficit de vitamina K en el recién nacido?

Respuestas:

- Vitamina K en dosis única por vía IM (1 mg).

- Vitamina K en 2 dosis por vía IM (1 ml).
- Vitamina K en dosis única por vía IM (1 ml).
- Vitamina K en 2 dosis por vía IM (2 mg).

158. Según MAIS - FCI indique: ¿Cuál es el tipo de determinante de la salud que existe en una comunidad rural con coberturas bajas de vacunación?

Respuestas:

- Biológicos.
- Ambientales.
- Conductuales.
- Sociales.

159. El cáncer de cérvix o cuello uterino en el estadio II se caracteriza por:

Respuestas:

- El carcinoma se extiende más allá del cuello, alcanzando la pared pélvica y compromete la vagina, sin llegar al tercio inferior.
- El carcinoma está estrictamente confinado al cuello, no se tiene en cuenta la extensión al cuerpo.
- El carcinoma se extiende más allá de la pelvis verdadera, compromete la mucosa de la vejiga o el recto.
- El carcinoma se extiende hasta la pared de la pelvis. El tumor comprende el tercio inferior de la vagina.

160. En la cirugía gastrointestinal se usan muchas técnicas comunes.

Relacione la técnica quirúrgica con la respectiva definición:

Técnica quirúrgica del aparato digestivo	Definición
1. Resecar	a. Procedimiento por el cual se corta un tejido y separa de otro.
2. Seccionar	b. Procedimiento en el que una parte de un órgano se corta y se extrae del cuerpo.
3. Anastomosar	c. Colocar una o más pinzas en ángulo recto sobre un tubo o un vaso.
4. Clampear	d. Procedimiento en el que dos órganos huecos se unen quirúrgicamente.

Respuestas:

- 1b, 2c, 3a, 4d.
- 1a, 2b, 3c, 4d.
- 1b, 2a, 3d, 4c.
- 1d, 2a, 3b, 4c.

161. ¿Cuál es la prueba de laboratorio específica para identificar el germen de la gonorrea?

Respuestas:

- Tinción de Giemsa.
- Tinción de Gram.
- Inmunofluorescencia directa.

- Microscopía de campo oscuro.

162. El parto después de una cesárea se trata de la expulsión vía vaginal de un feto mayor a 20 semanas en mujeres que tienen el antecedente de operación cesárea. Es importante tener una consideración especial para un nuevo parto sin complicaciones. De las siguientes consideraciones seleccione la Respuestas:

- Feto menor a 4000 gr y edad gestacional mayor a 41 semanas.
- Embarazos múltiples.
- Que la madre tenga un período intergenésico de al menos dos años y ninguna otra contraindicación.
- Siempre que la cesárea anterior haya sido por distocia.

163. El Proceso de atención de enfermería es el método de trabajo propio de la profesión, a través de sus fases de valoración, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación. Las siguientes opciones son parte de la primera fase. EXCEPTO:

- Reconocimiento de la respuesta a las intervenciones de Enfermería.
- Identificación de riesgos de afectaciones individuales o grupales.
- Detección de problemas y necesidades.
- Identificación del estado de salud real o potencial individual.

164. Indique las acciones y consideraciones que el profesional enfermero debe conocer en la administración de antibióticos profilácticos: El personal de salud debe contar con un protocolo de manejo de antibióticos. La administración de antibióticos debe ser dentro de 20 minutos para maximizar concentración tisular. Registrar la administración de antibióticos en la lista de verificación de cirugía segura, el documento será parte del Kárdex. Descontinuar la profilaxis antibiótica 24 horas después de realizar el procedimiento quirúrgico. En caso de procedimiento quirúrgico menores se administrará profilaxis antibiótica de acuerdo a la mejor evidencia científica. En caso necesario la profilaxis antibiótica puede extenderse a 72 horas.

Respuestas:

- a, b, c, d.
- b, c, d, e.
- a, c, d, e.
- b, d, e, f.

165. ¿En qué nivel hay que actuar para que la prevención en salud sea efectiva y no se tenga que intervenir en los demás niveles, considerando que con este accionar evitaremos las enfermedades y mejoraremos las condiciones de salud de la comunidad?

Respuestas:

- Primer nivel de prevención.
- Segundo nivel de prevención.
- Tercer nivel de prevención.
- Cuarto nivel de prevención.



166. La Organización Mundial de la Salud, ponderó los riesgos y los beneficios para la salud respecto a la prescripción y uso de los métodos anticonceptivos, por lo tanto estableció criterios de elección. ¿A que categoría corresponde una condición en la que, en general, los riesgos teóricos o comprobados superan las ventajas de usar el método?

Respuestas:

- Categoría 1.
- Categoría 2.
- Categoría 3.
- Categoría 4.

167. Para disminuir el riesgo de transmisión de la tuberculosis, se recomienda que todos los establecimientos de salud dispongan de medidas administrativas, ambientales y de protección personal. ¿Cuál es una medida de control administrativo?

Respuestas:

- Promover el tratamiento ambulatorio de la tuberculosis.
- Ventilación adecuada que permita el flujo natural de aire.
- Minimizar el uso de procedimientos que induzcan la tos en los afectados de TB.
- Recoger la muestra de esputo en ambientes con luz y ventilación natural.

168. Escoja la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes alteraciones se caracteriza por inflamación de la mucosa de la nasofaringe?

Respuestas:

- Rinitis.
- Pólipos nasales.
- Faringitis.
- Sinusitis.

169. Entre los exámenes de laboratorio que se realizan a un paciente con cáncer, se encuentran los bio marcadores, el CA 125 es un bio marcador para el diagnóstico de cáncer de:

Respuestas:

- Testículo.
- Tiroides.
- Próstata.
- Ovario.

170. Mujer de 57 años acude a un centro de salud por presentar cefalea intensa y epistaxis, el resultado de la toma de presión arterial es 170/90, con antecedentes familiares de hipertensión arterial, no está medicada. Sin tratamiento respectivo y control adecuado de la presión arterial. ¿Cuáles son las complicaciones a mediano y largo plazo?

Respuestas:

- Disminución de la elasticidad de los vasos sanguíneos importantes, por lo que la aorta y las grandes arterias tienen menos capacidad para alojar el volumen de sangre bombeado por el corazón.
- Edema dérmico, disnea paroxística nocturna, ortopnea, ganancia ponderal, ingurgitación yugular, disminución de la tolerancia a la actividad, gastritis congestiva.
- Hipotensión postural, pérdida de sodio, potasio o magnesio, hiperpotasemia, letargo, mialgias, resequedad de la boca, sed, debilidad, así como diarrea y otros síntomas digestivos.
- Hipertrofia ventricular izquierda, daño cardíaco extenso, cambios patológicos en los riñones, compromiso vascular cerebral que puede desencadenar ataque isquémico transitorio.

171. ¿Cuál es el medicamento, dosis y vía que usted administra en caso de toxicidad de sulfato de magnesio aplicado a una mujer embarazada que presentó convulsiones, de acuerdo con Score Mamá y claves obstétricas?

- Nifedipino 10 mg vía oral.
- Dexametasona 6 mg intramuscular.
- Gluconato de calcio 1 g por vía intravenosa.
- Betametasona 12 mg intramuscular.

172. Un paciente manifiesta que desde hace una semana, el yeso colocado en su miembro inferior está muy apretado y comienza a quejarse de mucho dolor. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería más idóneo para esta situación?

Respuestas:

- Riesgo de caída relacionado con inmovilización por yeso.
- Dolor crónico relacionado con agentes lesivos manifestado por expresión verbal de dolor.
- Riesgo de lesión relacionado con incapacidad para movilizarse.
- Dolor agudo relacionado con agentes lesivos manifestado por expresión verbal de dolor.

173. El accidente cerebrovascular se clasifica en dos categorías principales: isquémico en el que se presenta una hipoperfusión significativa, y hemorrágico donde ocurre una extravasación de la sangre dentro del cerebro. A continuación, identifique las causas principales del ACV isquémico:

Respuestas:

- Trombosis de arteria grande o pequeña, rotura de placa ateromatosa, embolo cardiogénico.
- Vasoespasmo cerebral, hipoxia cerebral, disminución de la presión intracraneal, hidrocefalia aguda.
- Aneurisma cerebral, malformaciones arteriovenosas, neoplasias intracraneales o ciertos medicamentos.
- Hipertensión, diabetes mellitus, hiperlipidemia, tabaquismo, obesidad, consumo excesivo de alcohol.

174. Las áreas en el cuidado físico del recién nacido son, EXCEPTO:

- Protección de infecciones y lesiones.
- Estimulación para el desarrollo de la motricidad gruesa.
- Mantenimiento de una vía aérea permeable.
- Mantenimiento de una temperatura corporal estable.

175. Dentro de las medidas terapéuticas que realiza el profesional de enfermería están la aplicación de calor y frío. ¿Cuál es un objetivo de la aplicación de calor?

Respuestas:

- Aumentar el aporte sanguíneo en la región tratada.
- Reducir el metabolismo basal.
- Aliviar el dolor causado por el aumento de líquidos circulantes.
- Reducir el edema e inflamación.

176. ¿Cuáles son los signos y síntomas de alarma en el adulto mayor?

Respuestas:

- Falta de apetito, sueño, cansancio, descuido en su apariencia personal, desmotivación, ansiedad y depresión.
- No se altera su atención y concentración en las actividades mentales como pensar, razonar y tomar decisiones.
- Su agilidad mental se no se altera y no presenta olvidos frecuentes.
- Actitud positiva hacia la persona adulta mayor dependiente (maltrato).

177. Paciente de 50 años, atendida en emergencia, refiere dolor a nivel abdominal y no realiza deposición hace 5 días. A la valoración presenta signos vitales dentro de parámetros normales. Le prescriben enema evacuante. ¿Cuál es la posición para realizar este procedimiento?

Respuestas:

- Decúbito ventral.
- Decúbito supino.
- Sims Izquierdo.
- Genucubital.

178. Paciente de 65 años, con antecedentes de Hipertensión Arterial, al momento se encuentra hospitalizado por presentar arritmia. Entre los medicamentos a administrar se encuentran: Insulina humana NPH 40 IU, Diltiazem 120 mg, Enoxaparina 40 mg y Morfina 10mg. ¿Cuál de los medicamentos administrados es un antihipertensivo?

Respuestas:

- Insulina humana NPH.
- Diltiazem.
- Enoxaparina.
- Morfina.

179. Seleccione el supuesto que guarda relación con la teoría planteada por Florence Nightingale:

Respuestas:

- Los métodos de asistencia deben basarse en la relación de ayuda y/o de suplencia de enfermería hacia el paciente.
- La enfermería es un proceso terapéutico interpersonal, que hace posible la salud.
- Los factores cognitivo-perceptivos motivan las actividades de promoción de la salud.
- Un entorno sano y favorable influye en el estado de salud físico y psíquico del hombre.

180. Durante la permanencia de la madre y el recién nacido en el establecimiento de salud, ¿Cuál es la técnica de lactancia materna que el profesional en enfermería debe enseñar a la madre?

Respuestas:

- Amamantar en posición adecuada, facilitar un buen agarre del seno, enseñar los signos de buen agarre, verificar que el niño mame bien.
- Amamantar en posición lateral, facilitar un buen agarre del seno, enseñar signos de buen agarre, verificar que el niño no duerma.
- Amamantar en posición sentada, la cabeza y cuerpo del RN están en línea curva y alineada hacia las piernas y el agarre es normal.
- Facilitar un buen agarre del seno, el recién nacido no topa el seno con el mentón para evita asfixia y la madre conserva su posición.

181. Seleccione los factores de riesgo laboral durante el embarazo:

1. Movimiento fetales, con presencia de tapon mucoso.
2. Posición de pie por tiempo prolongado (más de tres horas).
3. Esfuerzo físico excesivo, puede provocar daño al feto.
4. Control insuficiente prenatal, tres visitas y una última a las 20 semanas.
5. Exposición de agentes físicos, químicos y biológicos.
6. Levantar objetos pesados.

Respuestas:

- 1, 2, 3, 4.
- 2, 3, 5, 6.
- 1, 3, 5, 6.
- 1, 3, 4, 5.

182. Señale en qué nivel de la cadena de frío se cuenta con refrigeradoras para mantener las vacunas por cortos períodos de tiempo, termos o conservadoras para su uso diario.

- Nivel nacional o central.
- Nivel regional o provincial.
- Nivel local u operativo.
- Laboratorio productor.

183. La pérdida de calor al nacimiento, se produce por cuatro diferentes mecanismos, cuyos principios fisiológicos son parecidos a los de un objeto físico con la transferencia de calor a los objetos y ambiente a su alrededor. La transferencia de calor entre la superficie corporal del RN y la superficie sólida

del objeto en contacto; como el colchón frío, básculas, chasis de placas de rayos X, campos fríos, manos frías del reanimador se refiere a:

Respuestas:

- Convección.
- Evaporación.
- Radiación.
- **Conducción.**

184. Ordene los componentes del Apgar neonatal:

1. Calor.
2. Tono muscular.
3. Frecuencia cardíaca.
4. Irritabilidad refleja.
5. Respiración.

Respuestas:

- **3, 5, 2, 4, 1.**
- 3, 1, 4, 5, 2
- 1, 3, 4, 5, 2.
- 2, 3, 5, 4, 1.

185. Seleccione las modalidades de atención de los equipos integrales de salud según lo establecido por el MAIS-FCI:

1. Atención prehospitalaria.
2. Atención individual.
3. Atención extramural o comunitaria.
4. Atención en un establecimiento de salud.
5. Atención en establecimientos móviles de salud.
6. Atención al ambiente.

Respuestas:

- 3, 4, 5, 6.
- **1, 3, 4, 5.**
- 1, 2, 3, 4.
- 2, 3, 4, 6.

186. Al nacimiento del recién nacido se producen adaptaciones de los diferentes sistemas orgánicos. Seleccione los cambios en el sistema cardiovascular que ayudan a la transición desde la circulación fetal a la posnatal:

- a. Cierre del foramen oval.
- b. Persistencia del conducto arterioso.
- c. Cierre del conducto venoso.
- d. Descenso del volumen sanguíneo.
- e. Cierre del conducto arterioso.

Respuestas:

- a, d, e.
- b, c, e.



- a, b, d.
- a, c, e.

187. ¿Qué detecta la maniobra de Ortolani en la valoración física del neonato?

Respuestas:

- Polidactilia.
- Síndrome de Down.
- Cefalohematoma.
- Luxación congénita de cadera.

188. En el desarrollo histórico de la práctica de la enfermería, la religión ha jugado un papel fundamental. Seleccione la orden religiosa que se ocupó del cuidado de las personas con lepra, sífilis y trastornos crónicos de la piel.

Respuestas:

- Los Caballeros de San Lázaro.
- Los Hermanos Alexianos.
- Las Diaconisas de Kaiserswerth.
- Los Caballeros Hospitalarios.

189. Ordene los pasos a seguir para la realización de un plan local de salud:

- 1. Determinación de objetivos.**
- 2. Programación en Salud.**
- 3. Análisis de la situación.**
- 4. Evaluación. Priorización de necesidades o problemas.**
- 5. Ejecución.**

Respuestas:

- 1, 3, 5, 4, 2, 6.
- 2, 4, 3, 1, 5, 6.
- 3, 5, 1, 2, 6, 4.
- 4, 1, 6, 2, 5, 3.

190. En la administración de SRP. ¿Cuáles son los signos y síntomas que se pueden presentar si se habla de presencia de un ESAVI grave?

Respuestas:

- Llanto persistente de 0 a 24 horas de aplicación de la primera dosis de SRP.
- Síndrome de Guillain Barré de 0 a 6 semanas de aplicación de SRP.
- Convulsiones febriles que aparecen entre el 7mo y 12vo día.
- Linfadenitis supurativa de 2 a 6 meses de aplicación de SRP.

191. Entre los diagnósticos de enfermería más prevalentes en la Diabetes Mellitus, se encuentra el “Manejo inefectivo del régimen terapéutico”, indique que Intervenciones/NIC serían adecuadas al citado diagnóstico:

Respuestas:

- Aumentar el afrontamiento.
- Autoanálisis de glucemia.
- Cuidado de los pies.

- Educación proceso de enfermedad y Modificación de la conducta.

192. Según la profundidad de las lesiones, las quemaduras se clasifican en:

Respuestas:

- Quemaduras epidémicas o de primer grado, quemaduras dérmicas o de segundo grado, quemaduras subdérmicas o de tercer grado.
- Quemaduras epidémicas o de primer grado, quemaduras dérmicas superficiales o de segundo grado, quemaduras dérmicas profundas o de tercer grado, quemaduras subdérmicas o de cuarto grado.
- Quemaduras epidémicas o de cuarto grado, quemaduras dérmicas superficiales o de tercer grado, quemaduras dérmicas profundas o de segundo grado, quemaduras subdérmicas o de primer grado.
- Quemaduras epidémicas o de tercer grado, quemaduras dérmicas o de segundo grado, quemaduras subdérmicas o de primer grado.

193. De las siguientes afirmaciones referidas al desarrollo durante la pubertad señale la INCORRECTA:

Respuestas:

- Se considera pubertad precoz la aparición de signos puberales antes de los 7 años en las niñas y los 8 en los niños.
- La escala de Tanner se utiliza para valorar la madurez sexual.
- Las necesidades energéticas diarias en el adolescente se estiman en 2100-2400 kcal para las chicas y 2400-2800 kcal para los chicos.
- La aceleración del crecimiento en la pubertad, “estirón puberal”, se da antes en las chicas que en los chicos.

194. La escala de coma de Glasgow consta de varios apartados fundamentales que son:

Respuestas:

- Pares craneales, respuesta motora, respuesta sensitiva.
- Apertura de ojos, respuesta verbal, respuesta motora.
- Respuesta al dolor, respuesta verbal, respuesta motora.
- Reflejos oculares, reflejos tendinosos, reflejos espinales.

195. La acumulación de orina en la vejiga y la incapacidad de esta para vaciarse se denomina:

Respuestas:

- Incontinencia urinaria.
- Urgencia urinaria.
- Retención urinaria.
- Incontinencia refleja.

196. En la entrevista a un paciente durante la etapa de valoración, las preguntas abiertas presentan una desventaja, indíquela.

Respuestas:

- Puede revelar la afectividad del entrevistado respecto a un aspecto.
- Las respuestas son difíciles de registrar y hacerlo exige habilidad.
- Dejan hablar al entrevistado.



- Se concede demasiada importancia a las opiniones del entrevistado.
- 197. En pacientes con nutrición parenteral pueden aparecer complicaciones:**

Respuestas:

- En las primeras 48 horas suelen ser mecánicas y/o infecciosas.
- Las complicaciones infecciosas suelen aparecer antes de las 72 horas.
- En las primeras 48 horas suelen ser mecánicas y/o metabólicas.
- Transcurridos 3 meses, las únicas complicaciones que aparecen son mecánicas.

- 198. Los factores más importantes que predisponen la aparición de la anorexia y la bulimia en adolescentes son:**

Respuestas:

- La presión social y las características familiares y de personalidad.
- La pubertad.
- Las relaciones sociales exclusivamente.
- Exigencias profesionales.

- 199. La central de esterilización contribuye al proceso de asepsia y antisepsia del material hospitalario, en el cual la enfermera realiza las funciones de limpieza, desinfección y esterilización. Relacione los tipos de esterilización con los métodos en que se puede esterilizar y/o desinfectar los materiales:**

Tipo De Esterilización	Métodos
1. Por medios químicos	a. Gas de óxido de etileno.
	b. Calor seco.
	c. Peróxido de Hidrógeno.
	d. Clorhexidina.
2. Por medios físicos	e. Vapor saturado.
	f. Formaldehido.
	g. Hipoclorito de Sodio.
	h. Rayos ultravioleta.

Respuestas:

- 1acf, 2beh.
- 1adg, 2cfh.
- 1cdf, 2afg.
- 1bce, 2adg.

- 200. ¿Con cuántas dosis de vacuna parenteral inactivada de polio se consigue un nivel de protección cercano al 100% y duradero?**

Respuestas:

- Con más de 5 dosis.
- Con 1 sola dosis.
- Con 4 dosis.
- Entre 1 y 3 dosis.

- 201. El síndrome del túnel carpiano es el aprisionamiento de un nervio procedente del antebrazo al producirse una presión excesiva sobre él, a su**

paso por una zona angosta y estrecha entre huesos de la zona de la muñeca.
Indique el nervio principalmente afectado:

Respuestas:

- Nervio braquial.
- Nervio cubital.
- Nervio mediano.
- Nervio radial.

202. En el procedimiento para la administración de medicación por la vía oftálmica, se debe preparar y colocar al paciente (indique la respuesta correcta):

Respuestas:

- Sentar al paciente con la cabeza inclinada hacia adelante.
- Sentar al paciente con la cabeza inclinada hacia atrás.
- Sentar al paciente acostado en decúbito prono.
- Sentar al paciente acostado en decúbito lateral derecho o izquierdo según el ojo a instilar.

203. En un infarto agudo de miocardio, ¿qué alteración específica del registro electrocardiográfico aparece en los primeros segundos o minutos?:

Respuestas:

- Ondas T simétricas y picudas.
- Elevación del segmento ST.
- Onda Q anormal.
- Aparecen todos esos cambios a la vez.

204. De las siguientes vacunas, ¿Cuál se podría utilizar de forma segura durante la gestación?

Respuestas:

- Triple vírica.
- Gripe.
- Varicela.
- VPH.

205. El patrón hormonal del climaterio consiste en:

- Un aumento de estrógenos.
- Una disminución de gonadotropinas.
- Un descenso de estrógenos.
- Un aumento de progestágenos.

206. ¿A qué edad salen los caninos de leche en el niño?

Respuestas:

- 8-11 meses.
- 12-15 meses.
- 16-20 meses.
- 22-30 meses.

207. De las siguientes afirmaciones que se enumeran a continuación referidas al recién nacido prematuro, señale la correcta:

Respuestas:

- Suelen presentar exceso de surfactante pulmonar, provocando la enfermedad de la membrana hialina.
- Tienen escasas pérdidas insensibles de líquido través de la piel y la respiración.
- La temperatura de la incubadora ha de estar comprendida entre 28°C y 34°C.
- La humedad de la incubadora debe estar comprendida entre un 65-70%.

208. La fase de planificación del proceso enfermero implica:**Respuestas:**

- Obtener, Recoger, Organizar, Validar y Valorar.
- Identificar, Validar, Inferir e Interpretar.
- Priorizar, Definir objetivos y Estrategias.
- Actualizar datos, Actuar, Favorecer la relación de ayuda.

209. ¿Cómo se define al Proceso de Atención de Enfermería?**Respuestas:**

- Modelo conceptual y organizado de enfermería que define al hombre, a la familia y a la comunidad.
- Método sistemático y racional organizado para proporcionar cuidados de enfermería individualizados.
- Teoría desarrollada por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE).
- Acción realizada por la enfermera/o para prevenir la enfermedad y restablecer la salud.

210. ¿Cuáles son las etapas del método científico enfermero?**Respuestas:**

- Valoración, Ejecución, Diagnóstico, Planificación y Evaluación.
- Valoración. Diagnóstico. Planificación. Ejecución y Evaluación.
- Planificación, Valoración, Diagnóstico, Ejecución y Evaluación.
- Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación.

211. ¿Cómo se llama el trastorno del estado de ánimo que alterna episodios de euforia y de depresión en un período de tiempo concreto?**Respuestas:**

- Trastorno afectivo.
- Trastorno bipolar.
- Trastorno por depresión.
- Trastorno ciclotímico.

212. Respecto a la EPOC, señale la respuesta INCORRECTA:**Respuestas:**

- La EPOC es la única de las enfermedades crónicas frecuentes cuyas tasas de mortalidad no han disminuido en los últimos 30 años.
- En España, afecta aproximadamente al 10% de la población.
- Se considera que existe una obstrucción al flujo aéreo cuando la relación entre el volumen espiratorio forzado en el 1er segundo y la capacidad

vital forzada (FEV1/FVC) es inferior a 1 tras haber administrado un broncodilatador por vía aérea.

- El déficit de alfa1-antitripsina está relacionado con el enfisema, una patología del grupo EPOC.

213. Los modelos y teorías de Enfermería pretenden:

Respuestas:

- Describir, establecer y examinar los fenómenos que conforman la práctica de Enfermería.
- Describir los fenómenos que conforman la práctica de Enfermería al estudio de enfermedades congénitas.
- Examinar los fenómenos que conforman la práctica de Enfermería al estudio de enfermedades congénitas.
- Describir los fenómenos que conforman la práctica de Enfermería al estudio de enfermedades crónicas.

214. De entre las siguientes, señale la respuesta INCORRECTA en referencia a los trastornos alimentarios en la adolescencia:

Respuestas:

- El momento del diagnóstico es más temprano en la anorexia que en la bulimia.
- La mayor incidencia se da en el rango de edad de 18-25 años para la anorexia.
- Los trastornos de la conducta alimentaria son más frecuentes en el sexo femenino.
- La Pica es un trastorno alimentario que se caracteriza porque el adolescente ingiere sustancias no comestibles (papel, tela, tierra).

215. ¿Cómo definiría la figura de la enfermera gestora de casos?

Respuestas:

- Enfermera que facilita la participación de los miembros de la familia en el cuidado emocional y físico del paciente.
- Enfermera que dirige grupos de ayuda para proporcionar apoyo emocional información relacionada con la salud a sus miembros.
- Enfermera que facilita la capacidad de una persona enferma para interactuar con los demás.
- Enfermera que coordina la asistencia y defensa de los individuos y poblaciones en diversos contextos para mejorar la calidad de la asistencia y conseguir los resultados deseados, reducir costes y disminuir el uso de recursos.

216. Entre los factores de riesgo para el desprendimiento de placenta se incluye:

Respuestas:

- Consumo de alcohol.
- Sedentarismo.
- Hipertensión.

- Hipotiroidismo.

217. En los pacientes con alimentación por sonda enteral que se necesita administrar medicamentos directamente al tubo digestivo, pero dichos pacientes no pueden ingerirlos, y esta es la vía de administración indicada, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos (Señale la respuesta FALSA):

Respuestas:

- Comprobar la ubicación de la sonda y su permeabilidad.
- Está contraindicada la administración de comprimidos con revestimiento entérico o líquidos oleosos.
- Hay que tener especial precaución ante el riesgo de obstrucción en las sondas de poco calibre.
- Está indicada cuando hay intolerancia oral.

218. Señale los signos de alarma que deben hacer sospechar de la existencia de una situación de maltrato en el niño:

Respuestas:

- Dermatitis del pañal que no remite al tratamiento.
- Lesiones cutáneas, quemadura pequeñas redondas y profundas.
- No asistencia a un control previamente citado.
- Intoxicación por ansiolíticos o antidepresivos.

219. ¿Cuál de los siguientes test sirve para diagnosticar la demencia?

Respuestas:

- Test de Framingham.
- Escala de Palacios.
- Test de Fagerström.
- Test del informador (TIN).

220. El déficit de vitamina B12 es una de las características de:

- Anemia ferropénica.
- Anemia megaloblástica.
- Anemia hemolítica.
- Anemia sideroblástica.

221. Se define la intervención de enfermería como:

Respuestas:

- Cualquier tratamiento, basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de enfermería para favorecer los resultados esperados del paciente.
- Es un estado, conducta o percepción variable de un paciente o cuidador familiar sensible a los resultados de enfermería y conceptualizado a niveles de abstracción.
- Juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad, frente a procesos vitales/ problemas de salud reales o potenciales.
- Diagnóstico preclínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad frente a procesos vitales/ problemas de salud reales o potenciales.

222. Seleccione los cuidados que el paciente necesita para la preparación de la resonancia magnética.

1. Informar al paciente que no debe consumir alimentos durante al menos 1 hora antes del estudio.
2. Después del examen tiene que ingerir abundantes líquidos para eliminar los agentes de contraste.
3. Antes de que ingrese al examen se le indicará que debe retirarse todos los objetos metálicos.
4. Informar al paciente que suspenda los medicamentos con complementos de hierro.
5. Obtener información del paciente sobre antecedentes alérgicos o si tiene insuficiencia renal.

Respuestas:

- 2, 4, 5.
- 2, 3, 4.
- 1, 3, 5.
- 1, 3, 4.

223. ¿Cuál es la responsabilidad del profesional de salud con relación a los métodos anticonceptivos?

Respuestas:

- Dar información veraz sobre los métodos anticonceptivos a persona o a la pareja, quienes decidirán cuál utilizar.
- Elegir el método anticonceptivo ideal para la persona o para la pareja, tomando en cuenta su experiencia y según el criterio científico.
- Indicar métodos hormonales a personas que no han tenido hijos y métodos mecánicos a quienes ya han tenido por lo menos una gesta.
- Recomendar el preservativo, porque además de ser un método anticonceptivo es el único método que evita el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

224. Según la taxonomía NANDA ¿Cuál de estos diagnósticos identificamos en un adolescente que es incapaz de mantener una percepción completa e integrada del “Yo”?

Respuestas:

- Afrontamiento ineficaz de la salud.
- Trastorno de la identidad de una persona.
- Baja autoestima situacional.
- Baja autoestima crónica.

225. Respecto al burnout en el entorno sanitario, señale el enunciado correcto:

Respuestas:

- El burnout es un trastorno físico.
- La fatiga sucede por la alta capacidad para desarrollar el potencial.
- La construcción de liderazgos potentes ayuda a mitigar el efecto.

- Los síntomas son solo psicológicos.

226. Dentro de la estrategia “Adecuación de los recursos humanos del SNS a las necesidades de los servicios sanitarios” incluida en el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) se encuentra el proyecto:

Respuestas:

- Realizar un estudio sobre necesidades de profesionales de cuidados de Enfermería.
- Elaborar un sistema de información común sobre los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud.
- Mantener actualizado el estudio sobre las proyecciones de necesidades futuras de especialistas médicos.
- Estimular e impulsar las estancias de intercambio de residentes en centros públicos dependientes de los servicios de Salud.

227. ¿Cuál de los siguientes valores determinan una hemorragia postparto vaginal y por cesárea?

Respuestas:

- 450 mL en un parto vaginal y 950 mL en un parto por cesárea.
- 550 mL en un parto vaginal y 1 050 mL en un parto por cesárea.
- 400 mL en un parto vaginal y 900 mL en un parto por cesárea.
- 300 mL en un parto vaginal y 900 mL en un parto por cesárea.

228. El sistema de respuesta rápida (SRR) o claves obstétricas, está conformado por profesionales de la salud capacitados en estas claves. Cada miembro del equipo tiene funciones específicas. Si un equipo conformado por cuatro profesionales, en una institución de salud de tercer nivel de atención, da respuesta a la activación de la clave obstétrica roja. ¿Cuál es una de las funciones del Coordinador?

Respuestas:

- Verificar permeabilidad de la vía aérea.
- Suministrar oxígeno suplementario para conseguir saturación mayor a 90 %.
- Buscar la causa de hemorragia e iniciar el tratamiento.
- Garantizar el acceso de dos vías venosas con catéter N°16 o 18, una en cada brazo.

229. La enfermería es una disciplina versátil que se esfuerza por satisfacer las necesidades fisiológicas, psicológicas, socioculturales, de desarrollo y espirituales de los pacientes; en el marco de la praxis los profesionales de enfermería manipulan el entorno del paciente para incluir: sonido, nutrición, higiene, luz, comodidad, socialización y esperanza. ¿A qué teoría corresponde a este enunciado?

Respuestas:

- Teoría de Orem.
- Teoría de Leininger.
- Teoría de Nightingale.

- Teoría de Benner y Wrubel.

230. Cuál de los objetivos enumerados, NO se correspondería con el propósito de una investigación que se ha de centrar en la realización de un estudio descriptivo:

Respuestas:

- Calcular la prevalencia de la hipercolesterolemia en una comunidad.
- Determinar la incidencia de infarto agudo de miocardio en varones.
- Obtener datos reales sobre los motivos de consulta en los servicios de urgencia.
- Estimar el efecto de un taller de información nutricional en personas con obesidad.

231. Los componentes de la valoración geriátrica son:

- Físico, funcional, mental y socioambiental.
- Funcional, mental, social y cuidados de enfermería.
- Riesgo funcional, social y económico.
- Pluripatología, funcional y mental.

232. Los principales síntomas urinarios del síndrome genitourinario de la menopausia son:

Respuestas:

- Urgencia miccional, disuria y las infecciones del tracto urinario inferior.
- Poliuria y urgencia miccional.
- Incontinencia urinaria de esfuerzo.
- Incontinencia urinaria y en ocasiones fecal.

233. Al Centro de Salud tipo A, ingresa de emergencia paciente de 15 años, familiares refieren que se realizó parto domiciliario, atendido por partera, indicando que no salió la placenta por completo y presencia de sangrado en moderada cantidad. Al examen físico paciente agitada, palidez generalizada, sudoración profusa, Ecografía reporta restos placentarios, a la especuloscopia se observa restos corioplacentarios en cérvix. Signos vitales PA: 80/50 mmHg FC: 120 lpm, S02 97 % T: 36.7 °C GLASGOW 15/15 FR: 20 rpm SCORE MAMA 6, identificando un shock hipovolémico grado II. ¿Qué acción de enfermería aplicaría inmediatamente en el manejo inicial de la paciente?

Respuestas:

- Realizar masaje uterino o compresión bimanual permanente.
- Transferir a paciente a un nivel de mayor complejidad.
- Colocar 2 vías periféricas e iniciar infusión de líquidos.
- Tomar muestras sanguíneas en tres tubos.

234. Señale la infección de transmisión sexual que ocasiona enfermedad inflamatoria pélvica y complicaciones como la esterilidad:

Respuestas:

- Infección por Neisseria gonorrhoeae.
- Infección por condilomas acuminados.
- Infección por Sífilis.



- Infección por *Chlamydia trachomatis*.
- 235. Para la elaboración de un programa de educación sanitaria, es necesario:**
- Respuestas:**
- En la enseñanza de técnicas, es suficiente con realizar una única demostración práctica.
 - Se establecen prioridades sin definir plazos.
 - Las actividades educativas se realizan siempre en grupo.
 - Es conveniente que exista un grupo de responsables para el seguimiento del programa educativo.
- 236. Dentro de la clasificación de las disfunciones sexuales femeninas propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra:**
- Respuestas:**
- Falta o pérdida de deseo sexual.
 - Vaginismo orgánico.
 - Dispareunia orgánica.
 - Excitación sexual intermitente.
- 237. En un centro de salud se ha llevado a cabo una intervención en educación para la salud con 15 pacientes, dirigida a reducir la prevalencia de trastornos de ansiedad. Los evaluadores analizaron el tiempo que duró cada sesión, así como el grado de participación. Se puede decir que se ha realizado una evaluación:**
- Respuestas:**
- De impacto.
 - De resultados.
 - De proceso.
 - Implementadora.
- 238. Relacione el grupo químico del desinfectante con el mecanismo de acción que corresponda.**

Grupo químico	Mecanismo de acción
1. Alcoholes.	a. Inhibición de reacciones enzimáticas.
2. Liberadores de cloro.	b. Precipitación y desnaturalización de proteínas.
3. Aldehídos.	c. Inactivación de enzimas productoras de energía.
4. Compuestos de amonio cuaternario	d. Alteración en el ADN, ARN y la síntesis de proteínas.

Respuestas:

- 1b, 2a, 3d, 4c.
- 1c, 2d, 3a, 4b.

- 1a, 2b, 3c, 4d.
- 1d, 2c, 3b, 4a.

239. Ante una situación de hipotermia hay varios métodos de recalentamiento. ¿Cuál forma parte del recalentamiento pasivo?

Respuestas:

- Aumento de la temperatura corporal mediante el recalentamiento de la piel con manta eléctrica.
- Aumento de la temperatura corporal mediante la introducción en el organismo de aire o líquidos calientes.
- Aumento de la temperatura corporal mediante la producción de calor del propio paciente.
- Aumento de la temperatura corporal mediante la inmersión en tanque de agua caliente.

240. Paciente con diagnóstico de VIH positivo acude al centro de salud para recibir atención, pero el personal limita su cuidado por el miedo de contagiarse. ¿Qué derecho del paciente ha sido vulnerado?

Respuestas:

- Derecho a no ser discriminado.
- Derecho a decidir.
- Derecho a una atención digna.
- Derecho a la Información.

241. ¿Cómo denominaría los estudios analíticos en los que las unidades de análisis son agregaciones de personas y no sujetos individuales?

Respuestas:

- Estudios comunitarios.
- Estudios ecológicos.
- Estudios de prevalencia.
- Estudios factoriales.

242. Respecto a las úlceras por presión (UPP) indique la respuesta correcta:

Respuestas:

- Constituyen un problema clínico no evitable.
- La incidencia de las UPP es un indicador de la calidad de los cuidados prestados.
- La prevalencia de las UPP no es un indicador de la calidad de los cuidados prestados.
- Para prevenirlas hay que aumentar la presión de los puntos de apoyo.

243. ¿Cuál de los siguientes enunciados NO se encuentra entre los usos principales de la Epidemiología?

Respuestas:

- Establecimiento de normas de organización y de la atención médica.
- Establecer la magnitud y distribución de la salud-enfermedad.
- **Completar cuadros clínicos.**
- Describir la historia natural de la enfermedad y de los determinantes de su curso.

244. La Diabetes Mellitus (DM) se define como un conjunto de alteraciones metabólicas caracterizadas por hiperglucemia crónica y trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, consecuencia de defectos en la secreción de insulina, a la acción de ésta, o a ambas. ¿A qué tipo de DM corresponde la definición de “Se caracteriza por producción insuficiente y/o uso metabólico ineficiente de la insulina producida en el páncreas. Es el tipo más frecuente, alcanzando el 90 % de la enfermedad diagnosticada”.

Respuestas:

- Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1).
- **Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2).**
- Diabetes gestacional (DG).
- Diabetes Insípida.

245. En base a los TCA o Trastornos de la Conducta Alimentaria. Señale la respuesta incorrecta.

- Son una de las enfermedades crónicas más frecuentes en adolescentes y mujeres jóvenes.
- Es una alteración del patrón de ingesta o de la conducta sobre el control del peso que produce un deterioro biopsicosocial.
- La anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa son TCA.
- **El trastorno por atracones no es TCA.**

246. Al realizar la valoración de enfermería a un paciente adulto con herida penetrante en el hemitórax derecho, usted se percata que existe una marcada disminución del estado de conciencia y retracción del hemitórax afectado, inmediatamente realiza la monitorización y observa los siguientes datos: FR 30 respiraciones por minuto, FC 140 latidos por minuto, PA 70/35 mmHg y T 38.2 °C, sin embargo, a pesar de haber comprobado el correcto funcionamiento de todo el equipo, no se logra registrar el valor de la

saturación de oxígeno ni de su curva pletismográfica. ¿Cuál es la causa que impide registrar este signo vital?

Respuestas:

- Aumento de la frecuencia respiratoria.
- Disminución de la tensión arterial.
- Ausencia del murmullo vesicular.
- Aumento de la temperatura.

247. Para calcular la Razón de Muerte Materna (RMM); El indicador que divide para el número de nacidos vivos estimados para el año y multiplicado por 100 000 corresponde a:

Respuestas:

- Muertes maternas.
- Muerte materna tardía.
- Defunción Obstétrica directa.
- Defunción obstétrica indirecta.

248. Paciente masculino adulto atendido en emergencia, a la valoración de enfermería presenta: dolor intenso y distensión abdominal, sudoración, vómito, ictericia generalizada. ¿Cuál es la intervención de enfermería prioritaria en este caso?

Respuestas:

- Manejo del vómito.
- Valoración de ictericia.
- Manejo del dolor.
- Manejo de líquidos.

249. Al primer nivel de atención, acude la madre con su hijo de dos meses de edad para su respectivo control del niño sano. Establezca el orden de los pasos para el procedimiento según lo establece la Normativa del MSP:
Actividades preventivas signos vitales y antropometría Anamnesis Evaluación de la alimentación Promoción para la salud. Examen físico Evaluación del desarrollo psicomotor.

Respuestas:

- 1, 4, 3, 6, 7, 5, 2.
- 2, 5, 7, 3, 1, 6, 4.
- 3, 2, 6, 7, 4, 1, 5.
- 6, 3, 2, 1, 5, 4, 7.

250. Paciente 46 años va a hacer intervenido de una Colelitiasis durante la valoración pre quirúrgica el valor de la Hb es menor a 7 grs/dl, o Hto. (< 35%),



indican trasfundir paquetes globulares STAT, el tipo de suero que puede administrarse conjuntamente con la sangre y derivado es:

Respuestas:

- Lactato de Ringer.
- Suero Fisiológico al 0.9%.
- Dextrosa al 5 %.
- Dextrosa al 50 %.

251. "Un juicio clínico sobre las respuestas de una persona o grupo a procesos vitales, problemas de salud reales o potenciales que proporciona la base de los cuidados para el logro de los objetivos, de los que enfermería es la responsable". Esta definición pertenece a:

Respuestas:

- Proceso de Atención de Enfermería-PAE.
- Cuidado de Enfermería.
- Diagnóstico de Enfermería.
- Problema de Enfermería.

252. Seleccione las manifestaciones clínicas de la deshidratación grave en un niño de 3 años:

1. Letárgico o inconsciente.
2. Signo del pliegue vuelve lentamente.
3. Signo del pliegue vuelve muy lentamente.
4. Irritable e intranquilo.
5. Bebe ávidamente, con sed.
6. Bebe mal o no puede beber.

Respuestas:

- 2, 4, 5.
- 3, 5, 6.
- 1, 2, 4.
- 1, 3, 6.

253. Relacione los trastornos hipertensivos del embarazo con sus respectivos criterios de clasificación y definición:

TRASTORNO HIPERTENSIVO	CRITERIO
1. Hipertensión gestacional.	a. TAS $\geq$ 160 mmHg y/o TAD $\geq$ 110 mmHg y uno o más criterios de gravedad y/o afectación de órgano blanco.



2. Preeclampsia con signos de gravedad.	b. Desarrollo de convulsiones tónico-clónicas generalizadas Y/o coma, no atribuibles a otras patologías, o condiciones neurológicas.
3. Eclampsia.	c. TAS $\geq$ 140 mmHg Y/O TAD $\geq$ 90 mmHg, presente a partir de las 20 semanas de gestación y ausencia de proteinuria.

Respuestas:

- 1c, 2a, 3b.
- 1a, 2b, 3c.
- 1b, 2c, 3a.
- 1c, 2b, 3a.

254. Debemos sospechar una Hemorragia digestiva alta ante todo paciente que presente:

Respuestas:

- Hiperémesis y diarreas.
- Hematemesis y diarrea.
- Hematemesis y melena.
- Hemoptisis y melena.

255. El procedimiento en el que se inactivan todas las formas vegetativas bacterianas, virus y hongos y la mayoría de las esporas bacterianas para conseguir un nivel adecuado que permita un uso seguro para el paciente es:

Respuestas:

- Asepsia.
- Desinfección de nivel medio.
- Antisepsia.
- Desinfección de nivel alto.

256. Una joven adolescente acude a la consulta de enfermería y durante la entrevista observamos que presenta callosidades en los nudillos (signo de Russell). Este hallazgo nos puede indicar que:

Respuestas:

- Es víctima de malos tratos.
- Puede padecer algún trastorno de la conducta alimentaria.
- Practica algún tipo de deporte de contacto.
- Tiene alguna patología dermatológica.

257. ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo de los cuidados paliativos según la OMS?

Respuestas:

- Alivio del dolor y otros síntomas.
- Dar apoyo psicológico, social y espiritual.
- Considerar la muerte como un proceso anormal.
- Dar apoyo a la familia durante la enfermedad y el duelo.

258. De los siguientes parámetros de la función pulmonar ¿Cual NO se modifica durante el embarazo?

Respuestas:

- Capacidad inspiratoria.
- Capacidad vital.
- Volumen respiratorio circulante.
- Volumen residual.

259. En Salud Pública, la cantidad de personas de la comunidad que se ven afectadas por el problema de salud o la enfermedad que deba ser objeto de prevención y el impacto que éste problema tiene en la cantidad y calidad de vida de la comunidad, se asocia a la definición de:

Respuestas:

- Vulnerabilidad.
- Magnitud.
- Trascendencia.
- Viabilidad.

260. Seleccione las manifestaciones sospechosas de sífilis congénitas tempranas en el recién nacido:

1. Rinorrea sanguinolenta.
2. Gomas en pie.
3. Queratitis intersticial.
4. Erupción maculopapular.
5. Nariz en silla de montar.
6. Linfadenopatía generalizada.
7. Trombocitopenia.

Respuestas:

- 2, 4, 5, 7.
- 2, 3, 5, 6.
- 1, 4, 6, 7.
- 3, 5, 6, 7.

261. Seleccione los cuidados de enfermería específicos en pacientes que reciben medicación diurética:

Respuestas:

- Vigilar presencia de disnea y edema periférico.
- Vigilar la presencia de latido cardíaco irregular y edema.
- Vigilar signos de desequilibrio electrolítico e hipotensión postural.
- Vigilar la presencia de lipotimias, náuseas y vómitos.

262. Como profesional de enfermería del servicio de Pediatría, usted debe administrar una inyección intramuscular con un medicamento de origen biológico a un lactante. ¿Cuál es el sitio de administración?

Respuestas:

- Ventroglúteo.
- Deltoides.
- Vasto lateral.
- Glúteo mayor.

263. Al realizar la antropometría a la señora NN, usted encuentra que tiene un peso de 60 kilos y una talla de 1.50 metros. Calcule el Índice de Masa Corporal (IMC)

Respuestas:

- IMC= 26.6.
- IMC= 40.
- IMC= 2.5.
- IMC= 90.

264. Paciente de 45 años de edad, sexo masculino. Se encuentra en el área de Emergencia, por presentar: debilidad generalizada, náuseas y vértigo durante las últimas 24 horas; el médico indica administrar líquidos intravenosos, pero luego de realizar el procedimiento, el profesional en Enfermería observa que la piel alrededor del catéter esta tensa, blanqueada, fría al tacto y la perfusión se desaceleró. ¿Cuál es la complicación en esta terapia intravenosa?

Respuestas:

- Flebitis.
- Infiltración, extravasación.
- Infección local.
- Sangrado en el sitio de la venopunción.

265. Paciente de 85 años es llevada al hospital por su hija, quien refiere que desde hace 4 días su mamá se encuentra débil y decaída con poco

apetito y muy poca ingesta de líquidos. En la urgencia es valorada por un médico, quien verifica la presencia de mucosas orales secas, sin dificultad respiratoria, por lo que solicita exámenes de laboratorio. Los resultados de la gasometría arterial son: Na 142meq/L , K 2,9 meq/l , Cl 88 meq/l , Ph 7,50; PaCo2 24 mmHg; HCO3 34meq/l. Interprete los datos de laboratorio e identifique, ¿qué alteraciones del equilibrio ácido básico y electrolítico tiene la paciente?

Respuestas:

- Acidosis metabólica, hiponatremia, hipopotasemia.
- Alcalosis respiratoria, hiperpotasemia, hipocloremia.
- Acidosis respiratoria, hipernatremia, hipocloremia.
- Alcalosis metabólica mixta, hipopotasemia e hipocloremia.
- Alcalosis metabólica mixta, hipopotasemia e hipocloremia.

266. Hombre de 58 años con antecedentes de Diabetes Mellitus y asma, acude a la consulta al servicio de emergencias del hospital general, luego de haber sufrido un ataque de ansiedad, en la valoración se observa que presenta los siguientes síntomas; disnea, debilidad, mareo y confusión, además, el grado de recorrido de sus respiraciones se encuentra aumentado, a la exploración de los signos vitales se objetiva T 37 °C, R 30 rpm, P 98 lpm y presión arterial 140/80 mm/hg, sin otros hallazgos de interés. ¿Cuál de las alteraciones de la respiración presenta el paciente?

Respuestas:

- Hipoventilación.
- Hiperventilación.
- Taquipnea.
- Bradipnea.

267. Cuando el personal de salud participa en la identificación de las necesidades de salud y de calidad de vida de la población, para establecer prioridades de atención por parte de los servicios de la comunidad. Escoja ¿Cuál es la alternativa correcta en que participa el personal de salud?

Respuestas:

- Planificación estratégica, participativa y programación operativa.
- Programación de Salud.
- Diagnóstico comunitario.
- Coordinación intersectorial.

268. Una paciente con quemaduras de II grado en el 90% de su cuerpo, incluido labios y hemicara izquierda, tiene mucho dolor por lo que resulta

complicado hacerle cambio de posición. Presenta: taquipnea, diaforesis, se siente caliente, tiene escalofrío, es imperativo tomarle la temperatura. ¿Qué zona del cuerpo es más conveniente para tomar la temperatura, en este caso?

Respuestas:

- Oído.
- Oral.
- Rectal.
- Axilar.

269. Paciente que ingresa en el Servicio de Urgencias en contra de su voluntad, presenta los siguientes síntomas: Náuseas, vómitos, disnea, hipertensión arterial y edemas. Además, se encuentra obnubilado, con diagnóstico de síndrome de Alport hace cinco años, presenta un claro déficit de autocuidado de naturaleza alta. Se adopta un sistema compensatorio total. El objetivo prioritario es salvar la vida del paciente y estabilizar las funciones vitales. Presenta dificultad para tomar decisiones y llevar a cabo acciones de Auto cuidado. No hace uso de los recursos sanitarios adecuadamente, déficit a nivel de juzgar/actuar, no se posiciona en necesidad de ayuda, negación de su estado actual, patrón de eliminación inadecuado, déficit de conocimiento sobre la ingesta apropiada y gran desvío de su estado de salud: no diferencia salud ideal/salud real. ¿Cuál de las teorizantes se pone de manifiesto en el caso anterior?

Respuestas:

- Virginia Henderson.
- Hildegard E. Peplau.
- Dorothea Orem.
- Imogene M. King.

270. Cuando un paciente experimenta dolor, el profesional de enfermería debe valorar las características del mismo, tomando en cuenta la clasificación según el tiempo de evolución del dolor, y poder realizar acciones encaminadas a disminuirlo. ¿Cuál es la clasificación que se menciona?

Respuestas:

- Agudo y crónico.
- Somático superficial.
- Somático profundo.



- Dolor visceral.

271. Florence Nightingale, indica que, dentro de los principios bioéticos, los profesionales de enfermería deben “abstenerse de todo lo que sea perjudicial o maligno y de tomar o administrar drogas sabiendo que puedan ser nocivas a la salud”. ¿A qué principio bioético se refiere?

Respuestas:

- Principio de autonomía.
- Principio de beneficencia.
- Principio de No maleficencia.
- Principio de justicia.

272. Paciente con antecedentes de hipertensión arterial, acude al centro de salud para el control de rutina; durante la visita el médico decide cambiar su medicación habitual por Diltiazem 60mg cada 12 horas. ¿A qué grupo farmacológico pertenece el medicamento prescrito?.

Respuestas:

- Bloqueantes beta adrenérgicos.
- Inhibidores enzima convertidora de angiotensina.
- Antagonistas de los receptores de aldosterona.
- Antagonistas de los canales de calcio.

273. Paciente con antecedentes de hipertensión arterial, acude al centro de salud para el control de rutina; durante la visita el médico decide cambiar su medicación habitual por Diltiazem 60mg cada 12 horas. ¿A qué grupo farmacológico pertenece el medicamento prescrito?

.Respuestas:-

Antagonistas de los canales de calcio.

– Bloqueantes beta adrenérgicos

. – Inhibidores enzima convertidora de angiotensina

- Antagonistas de los receptores de aldosterona

Niño de 2 meses de edad es traído por su madre al centro de salud para revisión médica y vacunación. El médico lo revisa y autoriza la vacunación ya que cumple con un estado de salud adecuado. Al revisar el carnet de vacunación se observa que tiene aplicada la vacuna BCG y HB. De acuerdo al esquema de vacunación del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. ¿Cuál es el esquema a aplicarse en este caso?

Respuestas:

- Difteria, tétanos y Tosferina (DPT).
- Rotavirus, fIPV, Pentavalente y Neumococo Conjugada, primera dosis.
- Sarampión, Rubeola, Parotiditis. (SRP). Primera dosis.
- Vacuna bivalente oral contra la Polio (bOPV). Primera dosis.

274. En el área de Obstetricia, una paciente que está en el puerperio inmediato, presenta facies pálidas, agitación, dolor abdominal tipo cólico y loquios en escasa cantidad. La enfermera evidencia este particular, informa al médico de guardia y registra en su informe. ¿Qué concepto de pensamiento crítico muestra la enfermera?.

Respuestas:

- Perseverancia.
- Capacidad de análisis.
- Integridad.
- Autoconfianza.

275. Paciente mujer de 52 años que llega al servicio de urgencias de un hospital, refiere que desde hace un día presenta fiebre con dolor en la parte baja del abdomen y espalda, disuria, malestar general. El médico le valora y solicita toma de muestra de orina limpia, en mitad de la micción. ¿Qué intervención corresponde a la fase de planificación del proceso de atención de enfermería, en este caso?

Respuestas:

- Explicar el procedimiento al paciente.
- Proporcionar intimidad al paciente cerrando la puerta o la cortina.
- Evaluar el estado miccional del paciente.
- Evaluar la comprensión del paciente sobre la finalidad de la prueba y el método de recogida.

276. Paciente mujer de 52 años que llega al servicio de urgencias de un hospital, refiere que desde hace un día presenta fiebre con dolor en la parte baja del abdomen y espalda, disuria, malestar general. El médico le valora y solicita toma de muestra de orina limpia, en mitad de la micción. ¿Qué intervención corresponde a la fase de planificación del proceso de atención de enfermería, en este caso?

Respuestas:

- Explicar el procedimiento al paciente.

- Proporcionar intimidad al paciente cerrando la puerta o la cortina.

- Evaluar el estado miccional del paciente.

- Evaluar la comprensión del paciente sobre la finalidad de la prueba y el método de recogida.



El señor NN de 50 años de edad acude al servicio de Emergencia por presentar molestias al orinar desde hace varios días, es valorado y diagnosticado por el médico, con incontinencia urinaria secundario a hipertrofia prostática. ¿Qué intervención de enfermería, corresponde a este caso?.

Respuestas:

- Sondar si existe orina residual según proceda.
 - Dar tiempo suficiente para que se vacíe la vejiga (10 min).
- Vigilar la eliminación de la orina, incluida su coherencia, olor, volumen y color.
- Aplicar un sondaje intermitente según proceda.



277. Paciente ingresa al servicio de Ginecología con diagnóstico de Pielonefritis, el médico para su tratamiento le pide administrar Ciprofloxacina 400mg intravenosa cada 12 horas. Usted como personal de enfermería debe conocer del medicamento para evitar efectos adversos. ¿A qué grupo farmacológico pertenece este medicamento?.

Respuestas:

- Macrólidos.
- Fluoroquinolona.
- Aminoglucósidos.
- Cefalosporina

278. Paciente hospitalizado en el servicio de Terapia Intensiva con diagnóstico de Septicemia, el médico para su tratamiento le pide administrar Vancomicina 500mg intravenoso cada 6 horas. Usted como personal de enfermería debe conocer del medicamento para evitar efectos adversos. ¿A qué grupo farmacológico pertenece este medicamento?

Respuestas:

- Glicopéptidos.
- Fluoroquinolona.
- Macrólidos.
- Aminoglucósidos.

279. Usted realiza una visita domiciliaria, y durante la valoración detecta un paciente que presenta los siguientes síntomas: depresión, miedo a su alrededor y a sus familiares, incapacidad de afrontar problemas de la vida diaria y como consecuencia hostilidad y violencia. Para su intervención debe basar su actuación en un modelo de enfermería. ¿Cuál es la teorizante que utilizaría en este caso?

Respuestas:

- Jean Watson.
- Virginia Henderson.
- Hildegard Peplau.
- Dorothea Orem.

280.

Usted como personal de Enfermería debe proteger el derecho individual a la intimidad, tratar a los pacientes como ellos prefieran,

mantener la confidencialidad y respeto, independiente de los antecedentes personales. De acuerdo a los valores y conductas de la profesión. ¿Cuál es el valor esencial que aplicaría en este caso?

Respuestas:

- Altruismo.
- Dignidad Humana.
- Igualdad.
- Justicia.

281. Paciente hospitalizada con diagnóstico de Trombosis Venosa

Profunda, el médico para su tratamiento le solicita administrar Heparina sódica 10.000 UI intravenoso cada 24 horas, en el servicio cuenta con una presentación de 25.000 UI/5 ml. ¿Cuántos ml debe administrar?

Respuestas:

- 1 ml.
- 2 ml.
- 3 ml.
- 4 ml.

282. Paciente de 35 años ingresa al área de emergencia manifestando dolor intenso en hemitórax derecho acompañado de disnea por esfuerzo, la cual progresa hasta convertirse en una disnea tipo trepopnea. ¿En qué posición se dificulta la respiración del sujeto de cuidado?

Respuestas:

- Decúbito lateral.
- Bipedestación.
- Decúbito ventral.
- Decúbito dorsal.

283. Como enfermera del centro de salud entre sus actividades, es educar a las personas que reciben atención en la unidad, para lo cual debe planificar una charla educativa sobre Diabetes, como una estrategia para evitar el alto índice de las enfermedades crónicas. Su intervención debe basarse en un modelo de Enfermería. ¿Qué teorizante aplicaría en este caso?

Respuestas:

- Florence Nightingale.
- Virginia Herderson.
- Nola Pender.
- Dorothea Orem.



- 284.** En el servicio de Medicina Interna, recibe un paciente de 65 años con antecedentes de hipertensión arterial, que permaneció en urgencias 12 horas por una crisis hipertensiva. Luego de su estabilización debe ser controlado en hospitalización. El paciente está consciente, al deambular se apoya en los muebles, su marcha es débil, se encuentra con una solución intravenosa de mantenimiento. En el caso descrito ¿Cuál es la puntuación final de acuerdo a la escala de riesgo de caída de Morse?

Respuestas:

- 45 puntos.
- 50 puntos.
- 65 puntos.
- 75 puntos.

- 285.** Como profesional de Enfermería, usted va a esterilizar instrumentos y materiales, utilizando calor seco. Luego de alcanzada la temperatura requerida. ¿Qué tiempo es necesario para la esterilización por calor seco, a una temperatura de 170°C?

Respuestas:

- 120 minutos.
- 150 minutos.
- 180 minutos.
- 60 minutos.

- 286.** Paciente de 35 años con antecedentes de hipertensión arterial, presenta un embarazo de 20 semanas de gestación, acude al control prenatal y monitoreo de la tensión arterial porque en los últimos meses ha presentado cifras altas de presión. ¿Cuáles son las recomendaciones durante la toma de este procedimiento?

Respuestas:

- Paciente sentada, tensiómetro digital con manguito grande y apropiado que cubra la circunferencia del brazo.
- Paciente sentada, tensiómetro aerobio con manguito que cubra 1,5 veces de la circunferencia del brazo.
- Paciente sentada, con el brazo por debajo del nivel del corazón, tensiómetro digital con manguito que cubra el brazo.
- Paciente acostada, tensiómetro aerobio con manguito que cubra 2,5 veces de la circunferencia del brazo.

- 287.** Luis de 40 años acude a la emergencia por presentar palpitaciones, debilidad, dolor, presión del pecho, fatiga y mareos, al realizarle un



electrocardiograma se identifica una fibrilación ventricular, para el manejo le piden administrar una dosis inicial de un antiarrítmico. ¿Cuál es el medicamento que pertenece a este grupo farmacológico?

Respuestas:

- Adrenalina.
- Dopamina.
- Amiodarona.
- Atropina.

288. Paciente con diagnóstico de Bronquitis permanece con oxigenoterapia por mascarilla. Durante el turno de la mañana presenta secreciones en abundante cantidad, una de sus intervenciones es realizar examen físico como: auscultación del tórax donde se identifica sonidos fuertes, de tono bajo, retumbantes que se escuchan durante la espiración en campos pulmonares. ¿Cuál es el ruido adventicio que presenta el paciente?

Respuestas:

- Crepitantes.
- Roncus.
- Sibilancias.
- Estertores.

289. El profesional de enfermería para el cuidado integral de la persona, familia o comunidad; utiliza la implementación de las etapas del proceso de atención de enfermería que se interrelacionan entre sí para el logro del objetivo alcanzado. ¿A que característica del proceso hace referencia el enunciado?

Respuestas:

- Dinámico.
- Interactivo.
- Sistemático.
- Flexible.

290. Como profesional de enfermería, se encuentra preparando a un niño de 2 años para la consulta médica. Usted valora la función respiratoria con la medición objetiva del estado respiratorio. ¿Cuál es el rango normal de la frecuencia respiratoria en este caso?

Respuestas:

- 40 - 60 respiraciones por minuto.
- 18 - 25 respiraciones por minuto.
- 22 - 37 respiraciones por minuto.



- 12 - 20 respiraciones por minuto.

291. Paciente acude a un centro de salud para control de hipertensión, luego de 3 horas de espera y ante el reclamo del paciente, es atendido; le entregan la medicación para un mes y en la postconsulta le dan indicaciones sobre el tratamiento y la próxima cita. ¿Qué derecho se ha vulnerado en este caso? Respuestas:

- Derecho a una atención digna.
- Derecho a no ser discriminado.
- Derecho a la confidencialidad.
- Derecho a la información.

292. Paciente ingresa con antecedentes de insuficiencia valvular aórtica. El personal de enfermería debe realizar el examen físico para determinar algún sonido cardiaco anómalo que se origina a nivel de la aorta, para la cual debe utilizar técnicas de auscultación de focos cardiacos. ¿Cuál es la localización de este foco cardiaco o aórtico que hace referencia el enunciado?

Respuestas:

- Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda.
- Tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda.
- Segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha.
- Mitad inferior del esternón a lo largo de la línea paraesternal izquierda.

293. Paciente acude al hospital por presentar anorexia, náuseas, vómitos, letargo, debilidad, y signos de tetania, el médico solicita exámenes de laboratorio y decide ingreso con diagnóstico de hipomagnesemia grave, para su tratamiento le indica administrar 4gr de sulfato de magnesio, usted cuenta en el servicio con una presentación de 20%/10ml. ¿Cuántas ampollas (ml) administra?

Respuestas:

- 1 ampolla (10ml).
- 2 ampollas (20 ml).
- 1.5 ampollas (15ml).
- 0.5 ampolla (5 ml).

294. Paciente masculino de 33 años, con antecedentes de hipertensión arterial, acude a consulta externa para su valoración nutricional, para lo cual los profesionales de enfermería mesuran su antropometría, remitiendo los siguientes datos: IMC: 30.8, Perímetro de cintura: 105cm y Circunferencia de la Cadera: 73cm. ¿Cuáles son los resultados de la valoración nutricional reflejados en el sujeto?

**Respuestas:**

- Se evidencia una obesidad clase III, distribución de grasa tipo androide y riesgo de morbimortalidad cardiovascular.
- Se evidencia una obesidad clase I, distribución de grasa tipo androide y riesgo de morbimortalidad cardiovascular.
- Se evidencia una obesidad clase II, distribución de grasa tipo androide y no existe riesgo de morbimortalidad cardiovascular.
- Se evidencia una obesidad clase I, distribución de grasa tipo ginoide y riesgo de morbimortalidad cardiovascular.

295. Paciente femenina de 76 años, que llega al servicio de neurología manifestando que hace 2 meses le aparecieron movimientos involuntarios, repentinos e impredecibles como cierre y apertura de las manos y flexión y extensión de los pies, los cuales no tienen un ritmo específico y desaparecen durante el sueño y aumentan las preocupaciones del hogar. Hace 15 días percibe otras molestias como la protrusión de los labios como si lanzara besos; hace tres días refiere que emergieron movimientos violentos e involuntarios en el brazo y pierna derecha con dolores musculares y articulares, por lo que decide consultar. ¿Cuáles de las manifestaciones clínicas son tipificadas como subjetivas?

Respuestas:

- Mialgias intensas y artralgias.
- Temblores en extremidades con hemibalismo derecho.
- Movimientos coreicos en extremidades y monobalismo superior derecho. Protrusión de la comisura labial y mialgias intensas.

296. Paciente de 58 años de edad que acude a la consulta por presentar cuadro clínico de 72 horas de evolución caracterizado oliguria, hipercoluria y leve edema bi-maleolar bilateral que cede con cambios posicionales; el personal de enfermería valora los signos vitales encontrando una presión arterial de 160/90mmHg y al analizar el resultado del Examen de orina se reflejan Proteínas= + Hematíes= campo lleno. ¿Qué síndrome clínico presenta el usuario?

Respuestas:

- Síndrome nefrótico.
- Síndrome de Insuficiencia renal aguda.
- Síndrome de Insuficiencia renal crónica.
- Síndrome nefrítico.

297. Paciente de 32 años de edad, acude a la consulta por presentar un cuadro de cuatro días de evolución, caracterizado por eritema perioral. El paciente es evaluado en un comienzo en forma ambulatoria y tratado con medidas generales y una asociación de antihistamínicos y corticoides orales. El cuadro persiste y dos días más tarde se agrega exantema de mejillas y cuello, hiperestesia cutánea y aparición de vesículas y pústulas, al examen físico presión arterial 120/70 mm Hg; frecuencia cardíaca 82 latidos/min, frecuencia respiratoria 20/min y saturación de oxígeno arterial en 98%, temperatura 37°C. ¿Cuál es la etiqueta diagnóstica de enfermería que priorizaría en el paciente?

Respuestas:

- 00004 Riesgo de infección.
- 00086 Riesgo de disfunción neurovascular periférica.
- 00044 Deterioro de la integridad tisular.
- 00046 Deterioro de la integridad cutánea.

298. En el servicio de Medicina Interna, recibe una paciente de 65 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, que permaneció en urgencias 12 horas por una descompensación. Luego de su estabilización debe ser controlada en hospitalización. La paciente está consciente, su marcha es débil, se encuentra con una solución intravenosa de mantenimiento. ¿Cuál es la puntuación final de acuerdo a la escala de riesgo de caída de Morse?

Respuestas:

- 45 puntos.
- 50 puntos.
- 65 puntos.
- 75 puntos.

299. Paciente de 41 años, con diagnóstico reciente desde hace 2 meses de demencia senil, con tratamiento, que acude a urgencias por presentar alucinaciones y agitación. Se ingresa en el servicio de neurocirugía para valoración evidenciándose torpeza progresiva para la marcha, disfunción de esfínteres y desorientación de una semana de evolución. Al interrogatorio con antecedentes personales hipertensión arterial y familiares, dos hermanos con demencia tipo Alzheimer, además exploración complementaria una analítica normal. ¿Cuál es la etiqueta diagnóstica de enfermería que priorizaría en el paciente?

Respuestas:

- 00129 Confusión crónica.

- 00131 Deterioro de la memoria.
- 00128 Confusión aguda.
- 00222 Control de impulsos ineficaz.

300. Paciente de 67 años con antecedentes de hipertensión arterial, acude al hospital por presentar cefalea de moderada intensidad y presión arterial de 170/110mmHg, como causa aparente conflictos familiares. Además, indica dificultad para seguir con el tratamiento prescrito por el médico. ¿Cuál es la etiqueta diagnóstica que priorizaría en el paciente?

Respuestas:

- Mantenimiento ineficaz de la salud.
- Protección ineficaz.
- Gestión ineficaz de la salud.
- Síndrome de fragilidad del anciano.

301. Paciente con diagnóstico de esquizofrenia con tratamiento de Haloperidol, vía oral cada 8 horas. Durante su turno se presenta un error con el medicamento, al administrar en su lugar Alopurinol. Por lo tanto, usted decide libremente notificar este evento. ¿Cuál es el sistema de notificación que está aplicando en este caso?

Respuestas:

- No punitivo.
- Confidencial.
- Independiente.
- Capacidad de respuesta.

302. Paciente de 45 años, se encuentra hospitalizado en el área de medicina interna por insuficiencia renal aguda. En la visita médica es diagnosticado de conjuntivitis bacteriana aguda y se le prescribe instilación oftálmica de gentamicina 2 gotas cada 8 horas. Antes de la aplicación se debe preparar el medicamento. ¿Cuál es el primer paso para realizar la aplicación de la instilación oftálmica?

Respuestas:

- Comprobar el Registro de Administración de Medicamentos.
- Razón del medicamento.
- Preparar al paciente.
- Limpiar el párpado.

303. Una de las teorizantes de enfermería se centra en el individuo como un sistema biopsicosocial adaptativo que emplea un ciclo de realimentación de entradas (estímulos), producción (procesos de control)

y salidas (conductas o respuestas adaptativas). ¿Cuál es la teorizante que utiliza este enfoque?

Respuestas:

- Betty Neuman.
- Callista Roy.
- Virginia Henderson.
- Martha Rogers.

304. Durante la guerra civil (1861-1865), hubo la participación de una notable líder enfermera, quien se preocupó de las relaciones entre culturas y razas, dio luz a una conciencia de la diversidad cultural y respeto por la persona, sin tener en cuenta su procedencia, raza, color o religión. ¿A cuál de las siguientes enfermeras se le atribuye este enunciado?

Respuestas:

- Isabel Hampton.
- Dorothea Dix.
- Harriet Tubman.
- Mary Mahoney.

305. En traumatología se encuentra paciente femenino de 28 años, por presentar esguince grado II de miembro inferior izquierdo, caracterizado por edema y dolor a la palpación. Se recomienda mantener reposo relativo, elevación de extremidad afectada y colocación de vendaje elástico compresivo. ¿Cuál de las siguientes acciones de enfermería previene complicaciones por el uso de vendaje elástico compresivo?

Respuestas:

- Observar si hay zonas de riesgo de ruptura de la piel tras el uso del vendaje.
- Valorar el grado en que la piel se expone a la humedad al mantener el vendaje.
- Evaluar la circulación distal tras la aplicación del vendaje al menos dos veces cada 8 horas.
- Valorar la presencia de fricción y/o cizallamiento realizado al retiro del vendaje.

306. Paciente de 66 años, hospitalizado desde hace 15 días en el área de UCI con ventilación mecánica invasiva. Durante el turno se observa que el paciente presenta mal olor y presencia de secreción blanquecina a nivel bucal. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es prioritaria para realizar la higiene oral al paciente?



Respuestas:

- Cepillar primero las superficies exteriores de los dientes.
- Aplicar solución antiséptica de clorhexidina al 0.12%.
- Evitar realizar aspiraciones durante el procedimiento.
- Un enfermero se encarga del cuidado de un paciente.

307. Los diagnósticos de Enfermería son parte del plan de cuidados del paciente, fundamentados en la valoración; ¿Cuál de los siguientes aspectos no es parte de este proceso?

Respuestas:

- Criterios para la valoración específica.
- Descripción de las alteraciones reales o potenciales.
- Diagnósticos clínicos.
- Factores etiológicos y concurrentes.

308. Relacione los 4 principios de la Bioética con la definición correspondiente:

Principio	Definición
1) Beneficiencia	a) Capacidad para actuar con conocimiento de causa, respeto activo a la libertad de la persona; no solo absteniéndose de obstaculizarla sino procurando que se den las condiciones necesarias para ejercerla.
2) Justicia	b) Se remonta a la más antigua tradición médica, está contenido en el Juramento Hipocrático (primum non nocere) Debe ser exigido en forma imperativa. Consiste en no producir daño intencionalmente.
3) No maleficiencia	c) Distribución equitativa de beneficios y cargas entre los miembros de una sociedad. Casos iguales requieren tratamientos iguales.
4) Autonomía	d) Obligación de actuar en beneficio del enfermo ayudándole a promover sus legítimos intereses, también se encuentra en el juramento hipocrático, para poder aplicarlo se requiere hacer el bien y ser benevolente (hacerlo con buena voluntad).

Respuestas:

- 1a, 2b, 3c, 4d.
- 1d, 2c, 3b, 4a.
- 1c, 2b, 3a, 4d.
- 1d, 2c, 3a, 4c.

309. Una paciente de 85 años, fue dada de alta después de un evento cerebro vascular, tiene afectación neuromuscular. Egresa en compañía de la hija. Si usted utiliza el modelo de Dorotea Orem, el objetivo para el plan de egreso debe ser:

Respuestas:

- Enseñar a la paciente a utilizar los recursos adaptativos para favorecer su autosuficiencia.
- Atender a la paciente en su domicilio cada vez que tenga necesidades insatisfechas.
- Minimizar el riesgo de lesiones, utilizando compañía permanente.
- Entrenar a la hija para que realice el soporte óptimo de los sistemas afectados.

310. ¿Cuáles son los conceptos descritos por Florence Nightingale en la teoría del entorno, que se deben manejar en la atención a pacientes?

Respuestas:

- Temperatura, confort, silencio, dieta y desinfección.
- Ventilación, temperatura, silencio, dieta e higiene.
- Desinfección, esterilización, descanso, temperatura y dieta.
- Silencio, climatización, energía, dieta y temperatura.

311. Usted atiende a un paciente de reciente ingreso a emergencia, con dolor abdominal agudo que aún no ha sido diagnosticado clínicamente, se deben realizar acciones de enfermería, EXCEPTO:

Respuestas:

- Enseñanza de tolerancia al dolor y acompañamiento.
- Enseñanza de técnica de relajación.
- Informe verbal de dolor y escucha activa para valoración.
- Esta opción de respuesta es la correcta porque administración de analgesia inmediata sin prescripción médica.

312. Profesional en enfermería de la sala de Pediatría interpreta de manera equivocada la prescripción médica registrada en la historia clínica, la cual tenía problemas de legibilidad, esta acción provocó un evento adverso en

el paciente. Superada la emergencia, ¿Cuál debe ser la actitud del profesional en enfermería?

Respuestas:

- Registrar y reportar el evento adverso al médico para que informe a la madre del paciente lo sucedido.
- Pedir a la madre del paciente que no comente con nadie lo sucedido y comunicar al líder del servicio.
- Conversar con un compañero de trabajo la situación y decirle a la madre del paciente que todo está bien.
- Omitir el registro del evento y decir a la madre que la reacción de Carlitos era un efecto del medicamento.

313. Paciente ingresa al hospital con un embarazo a término más labor de parto, luego de una hora de su ingreso, es valorada. Durante la valoración el médico le dice que la va a examinar; la paciente se encuentra tímida e intenta cubrir su cuerpo con la sábana; el médico pide al estudiante de medicina que realice el tacto vaginal, la paciente se pone tensa y rígida, por lo que le llaman la atención para que colabore en el procedimiento que es necesario, luego el médico procede a comprobar la valoración realizada por el estudiante, la paciente continúa angustiada; el enfermero profesional se encuentra junto a la paciente realizando su reporte. ¿Cuál debe ser la actitud del enfermero profesional frente a esta situación?

Respuestas:

- Tomar la mano de la paciente para tranquilizarle y anotar lo observado en el expediente.
- Llamarle la atención al médico ese momento y recordarle la norma para la valoración por tacto vaginal.
- Explicar el procedimiento a la paciente y dialogar con el médico en privado recordándole la norma para evitar tactos numerosos.
- Comunicar al jefe de servicio luego del procedimiento, dialogar con el médico y recordarle las normas de la valoración por tacto vaginal.

314. Paciente de 17 años de edad, ingresa al servicio de Gineco-Obstetricia, cursa con un embarazo de 40, 3 semanas de gestación, se encuentra en la primera etapa del parto, fase activa. Se aprecia en la paciente nerviosismo y miedo, generado por la labor de parto. Mediante la valoración de Enfermería, ¿Cuál de los siguientes patrones funcionales de Gordon se encuentra alterado?

Respuestas:



- Cognitivo perceptual.
- Adaptación y tolerancia al estrés.
- Autopercepción-Autoconcepto.
- Percepción y manejo de la salud.

315. Enfermero profesional de emergencia, en su turno acude una paciente de 20 años de edad, primigesta; al realizar el cálculo de las semanas de gestación, se determina que la paciente se encuentra en la semana 34, la paciente se encuentra agitada, rubicunda y refiere cefalea intensa. ¿Qué actividades inmediatas y prioritarias se debe realizar para determinar el diagnóstico de enfermería?

1. Toma de presión arterial.
2. Valorar el nivel de hemoglobina.
3. Tomar la temperatura.
4. Valorar actividad uterina.
5. Realizar proteinuria en tira reactiva.
6. Valorar pérdidas transvaginales.

Respuestas:

- 1, 5.
- 2, 4.
- 2, 5.
- 3, 6.

316. Durante el ciclo endometrial, se producen algunas fases: menstrual, proliferativa y secretora. Identifique el cambio que se produce en la fase proliferativa:

Respuestas:

- Aumenta la producción de la hormona luteinizante (LH).
- Aumenta la producción de hormona estimulante del folículo (FSH).
- El cuerpo amarillo secreta la hormona progesterona.
- El endometrio, grueso y congestionado, se vuelve hemorrágico.

317. El principio de obtener el consentimiento informado es obligatorio, pero el requisito ético y legal de obtenerlo explícitamente, es en los siguientes casos, EXCEPTO:

Respuestas:

- En tratamientos exigidos por la ley y cuando es necesario corregir una alteración inesperada durante la intervención.
- Cuando mayores sean los riesgos que la intervención médica.



- Esta opción de repuesta es incorrecta porque en tratamientos o intervenciones médicas que no sean urgentes.
- Cuanto más experimental sea el tratamiento o la intervención médica.

318. Usted como profesional de Enfermería identifica el siguiente diagnóstico enfermero: déficit de volumen de líquidos, relacionado con pérdida activa de sangre, manifestado por disminución de la presión arterial, sequedad de mucosas orales, aumento de la frecuencia del pulso, debilidad y sed. En la planificación de sus cuidados, ¿Qué resultado esperado elige usted para la paciente según el diagnóstico enfermero citado? Elija la respuesta correcta:

Respuestas:

- Termorregulación.
- Equilibrio electrolítico y ácido - base.
- Eliminación urinaria.
- Aumento de volemia.

319. Relacione el término con la definición correcta:

1. Dispareunia	a. Dolor que aparece en la menstruación junto con otros síntomas
2. Dismenorrea	b. Hemorragia vaginal no asociada al ciclo menstrual
3. Amenorrea	c. Dolor y dificultad durante las relaciones sexuales
4. Metrorragia	d. Ausencia de menstruación o interrupción de la menstruación.

Respuestas:

- 1a, 2b, 3c, 4d.
- 1d, 2a, 3c, 4b.
- 1c, 2a, 3d, 4b.
- 1b, 2c, 3d, 4a.

320. Los siguientes son factores que se deben tomar en cuenta en la asesoría del personal de enfermería al momento de elegir un método anticonceptivo, EXCEPTO:

Respuestas:

- El profesional de salud debe recomendar el método que con sus conocimientos considere que es el adecuado para la persona o pareja.

- Existen muchos métodos anticonceptivos y es recomendable a lo largo de la vida fértil usar más de uno.
- Se debe tomar en cuenta los beneficios y efectos secundarios de cada método anticonceptivo para poder hacer una buena decisión.
- La efectividad de un método se puede potencializar si se combinan dos métodos anticonceptivos.

321. Señale las ventajas de los métodos anticonceptivos hormonales:

Respuestas:

- Reducción de sangrado y cólicos menstruales, previenen la ovulación y la transmisión en enfermedades de tipo sexual.
- Periodos menstruales regulares y breves, reducen el riesgo de cáncer ovárico y de endometrio.
- Reducen cambios fibroquísticos en las mamas, se puede tomar a día alterno, puede combinarse con otro método hormonal.
- Reducen quistes ováricos, se usa durante la lactancia, uso en mujeres obesas, previenen problemas circulatorios.

322. En el servicio de emergencia se recibe a un paciente NN, de 27 años de edad, soltero, el cual está acompañado por su madre. El paciente presentó fiebre (no cuantificada) en horas de la madrugada, sin recibir medicación alguna, al igual que escalofríos, dificultad para respirar, cefalea; por ello es traído a dicho centro asistencial, luego de ser valorado por el médico de guardia, deciden su ingreso con una impresión diagnóstica de Neumonía de lóbulo inferior izquierdo. Al tomar los signos vitales presenta: temperatura de 39.5 grados axilar, respiración 20 por minuto, tensión arterial: 110/70 mmhg y pulso: 110 por minuto, piel sudorosa y caliente, mucosas orales secas. Identifique el diagnóstico real del paciente utilizando el formato PES, para la planificación de los cuidados de enfermería:

Respuestas:

- Intolerancia a la actividad relacionada entre el suministro y la demanda de oxígeno y evidenciado por disnea.
- Hipertermia relacionado con enfermedad, manifestado por piel sudorosa y caliente al tacto.
- Alteración nutricional, y metabólica por defecto relacionada con dieta hipoalérgica evidenciado por pérdida de apetito.
- Alteración del patrón del sueño relacionado a estadía hospitalaria evidenciado por irritabilidad y facies de cansancio.

323. Seleccione en qué dimensión de enfermería existen problemas o situaciones cuya prescripción y tratamiento requieren la colaboración de otros profesionales de la Salud para un tratamiento conjunto definitivo.

Respuestas:

- Interdependiente.
- Dependiente.
- Curativa.
- Independiente.

324. Al servicio de emergencia donde usted trabaja llega una paciente que sufrió una caída de 5 metros de altura con posible trauma craneo encefálico, se solicita que la valore con la aplicación de la escala de Glasgow. Identifique los criterios de evaluación:

Respuestas:

- Respuesta verbal, signos vitales y estado de conciencia.
- Respuesta verbal, respuesta motora y apertura de ojos.
- Respuesta motora, reflejos osteotendinosos y contracturas.
- De coordinación, apertura de ojos y movimientos.

325. ¿Cuáles son los mecanismos físicos principales por los que un paciente pierde calor con facilidad?

Respuestas:

- Evaporación, condensación, ebullición, precipitación.
- Condensación, evaporación, convección, radiación.
- Radiación, conducción, convección, evaporación.
- Cristalización, Isomerización, condensación, radiación.

326. Se aplica una inyección intramuscular en el musculo deltoides. Las siguientes son precauciones que debe tener, EXCEPTO:

Respuestas:

- El brazo debe estar relajado.
- Valorar el estado del músculo deltoides.
- Aplicar el medicamento 3 a 5 cm debajo del Acromion.
- Aplicar el medicamento 5 a 8 cm debajo del Acromion.

327. Un paciente refiere que luego de ingesta de alimentos condimentados presenta oliguria y dolor suprapúbico que le dificulta un poco al caminar, en la valoración: creatinina de 14 mg/dl y globo vesical, por lo que se procede a colocar sonda. ¿Cuál es el patrón prioritario?

Respuestas:

- Eliminación.



- Actividad-ejercicio.
- Cognitivo-perceptual.
- Nutricional-metabólico.

328. De los siguientes tipos de catéter que se utiliza para la administración de medicación intravenosa, identifique dos caracteres de cada tipo:

TIPOS DE CATETER	CARACTERÍSTICAS
1. Catéter Venoso Periférico	a) Tiene material radio paco
	b) Inserción en vena superficial
2. Catéter Venoso Subcutáneo	c) Inserción en vena subclavia
	d) Inserción vena cava superior
3. Catéter Venoso Central	e) Con cánula corta
	f) Tiene un reservorio

Respuestas:

- 1 bc, 2 de, 3 af.
- 1bf, 2 ad, 3 ce.
- 1 ae, 2 bc, 3 df.
- 1 be, 2 df, 3 ac.

329. Los siguientes son materiales que se utilizan para lograr en el paciente una alineación corporal anatómica correcta, EXCEPTO:

Respuestas:

- Elevador de Hoyer.
- Tablero para pies.
- Férulas de yeso.
- Sacos de arena.

330. Paciente refiere dolor lumbar que le dificulta realizar sus actividades diarias, el médico prescribe colocar calor local en el sitio del dolor. Seleccione las medidas de seguridad que debe aplicar en este procedimiento.

1. Colocación directa de la bolsa.
2. Sacar el aire residual de la bolsa.
3. Colocar la bolsa de 40 min a 1 hora.
4. Verificar la temperatura del agua.
5. Administración de antibióticos.
6. Compresión en la zona afectada.
7. Vigilar la zona de aplicación.
8. Cubrir la bolsa con una toalla.

Respuestas:

- 1, 3, 5, 6.



- 1, 4, 6, 7.
- 2, 4, 7, 8.
- 2, 3, 5, 8.

331. ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco?

Respuestas:

- Frecuencia cardiaca x volumen diastólico.
- Frecuencia cardiaca x volumen cardíaco.
- Frecuencia cardiaca x volumen sanguíneo.
- Frecuencia cardiaca x volumen sistólico.

332. En la planificación para el cuidado del paciente crónico dentro y fuera del hospital es prioridad satisfacer las necesidades de confort. Los siguientes son procedimientos de confort que usted debe aplicar al paciente, EXCEPTO:

Respuestas:

- Masajes y ejercicios.
- Baño de esponja en cama.
- Colocación de enema evacuante.
- Cambio de posiciones.

333. La mecánica corporal estudia el funcionamiento correcto y armónico del aparato musculo-esquelético y le permite a la enfermera realizar movimientos correctos durante la movilización, traslado o transferencia de la persona o paciente. ¿De los siguientes principios básicos, cuál no debería aplicar en una correcta mecánica corporal?

Respuestas:

- Posturas con sobrecarga biomecánica.
- Conservar bajo el centro de gravedad.
- Cuerpo apoyado sobre una base de sustentación.
- Alinear las relaciones corporales.

334. La central de esterilización contribuye al proceso de asepsia y antisepsia del material hospitalario, en el cual la enfermera realiza las funciones de limpieza, desinfección y esterilización. Relacione los tipos de esterilización con los métodos en que se puede esterilizar y/o desinfectar los materiales:

TIPO DE ESTERILIZACIÓN	MÉTODOS
1. Por medios químicos	a) Gas de óxido de etileno
	b) Calor seco

2. Por medios físicos	c) Peróxido de Hidrógeno
	d) Clorhexidina
	e) Vapor saturado
	f) Formaldehído
	g) Hipoclorito de Sodio
	h) Rayos ultravioleta

Respuestas:

- 1cdf, 2afg.
- 1adg, 2cfh.
- 1acf, 2beh.
- 1bce, 2adg.

335. De las siguientes soluciones, seleccione el antiséptico que se utiliza en asepsia de eventos quirúrgicos de larga duración:

Respuestas:

- Clorhexidina.
- Hipoclorito de sodio 1%.
- Glutaraldehído.
- Alcohol 70% o al 75%.

336. De la siguiente lista de actividades, indique aquellas que garantizan un cuidado seguro al paciente:

1. Uso de protocolos clínicos. Implementación de medidas de desempeño.
2. Prevención de caídas.
3. Revisión de indicadores.
4. Desarrollo de plan de acciones.
5. Comunicación clara y precisa.
6. Identificación de procesos.
7. Control de infecciones.

Respuestas:

- 2, 4, 5, 7.
- 2, 3, 5, 6.
- 1, 2, 4, 7.
- 1, 3, 6, 8.

337. Para evitar errores en el registro de la administración de la medicación es importante que en la historia clínica del paciente se registre la aplicación del medicamento. ¿Qué datos correctos registraría usted como profesional enfermera en el Kardex?

Respuestas:

- Nombre del medicamento, paciente correcto, dosis, iniciales de la persona que administra.
- Fecha, nombre del medicamento, dosis, hora, vía, función, iniciales de la persona que administra.
- Nombre del medicamento, acción correcta, forma correcta, respuesta correcta.
- Nombre de medicamento, dosis, vía, hora, forma correcta, paciente correcto.

338. Seleccione las medidas de prevención que se debe aplicar para evitar las infecciones hospitalarias asociadas a la salud (IAAS):

1. Aplicación de medidas de bioseguridad.
2. Educación y entrenamiento al personal.
3. Sistema de distribución de medicación.
4. Uso racional de antimicrobianos.
5. Limpieza y desinfección de ambientes.
6. Programas de motivación.
7. Registro de incidentes en pacientes.

Respuestas:

- 1, 3, 6, 7.
- 2, 3, 5, 6.
- 1, 2, 4, 5.
- 2, 5, 6, 7.

339. Usted aplica medidas de confort en el paciente encamado con una hemiplejía del lado izquierdo con músculos espásticos. ¿Qué ejercicios usted realiza al paciente?

Respuestas:

- Relajación muscular y cambios posturales.
- Ejercicios activos de músculos.
- Ejercicios de reeducación muscular.
- Ejercicios de resistencia muscular.

340. Complete la siguiente información :El código deontológico es el _____sistematizado de normas que el mismo _____disciplinar comparte y al que se _____.

Respuestas:

- Grupo, equipo, mantiene.
- Código, principio, juzga.
- Conjunto, grupo, compromete.

- Mecanismo, módulo, cumple.

341. Se requiere contar con un consentimiento informado suscrito en los siguientes casos. EXCEPTO:

Respuestas:

- Situaciones de emergencia que pone en riesgo la vida.
- Procedimientos endoscópicos diagnósticos y terapéuticos.
- Tratamientos de radioterapia y quimioterapia.
- Procedimientos de reproducción asistida.

342. De los siguientes enunciados. ¿Cuál corresponde al pensamiento crítico en Enfermería?

Respuestas:

- Proceso permanente de crecimiento intelectual y emocional que implica aprender nuevos conocimientos, resolver problemas, hacer juicios.
- Modelo sistemático y ordenado de pasos para recoger datos y resolver problemas, utilizado por los profesionales del equipo sanitario.
- Proceso de indagación continua y perseverancia combinada dirigido al logro de un objetivo que permite emitir juicios basados en evidencia.
- Implica evaluar la solución en un cierto plazo de tiempo para cerciorarse si es efectiva, realizando diversas opciones si se repite un problema.

343. Consentimiento informado en la práctica asistencial de salud es:

Respuestas:

- Un documento legal dentro del proceso de comunicación que forma parte de la relación del profesional de salud y el paciente, por el cual una persona autónoma acepta, niega o revoca una intervención de un miembro del equipo de salud.
- No importa quien haga firmar el consentimiento informado, interesa más que esté firmado por el paciente. Quien realiza la intervención tiene que asumir el deber de informar.
- Un paciente con su capacidad intelectual alterada debe firmar el consentimiento informado para poder realizar los procedimientos que necesite. El Consentimiento Informado apoya en cumplir con todos los Principios Éticos.
- El consentimiento informado es básicamente un proceso verbal en la atención de salud. Considerar que una vez iniciada una intervención ya no puede ser retirada, bajo ningún concepto, aunque haya dejado de ser útil o el paciente capaz la rechace, es cuestionable ética y jurídicamente.

344. Seleccione la secuencia para la administración de un enema de limpieza:

1. Mantener la sonda en el recto de manera continua hasta el final de la instalación del líquido.
2. Insertar el extremo de la sonda lentamente, señalando la punta en dirección del ombligo.
3. Colocar al paciente en posición decúbito lateral izquierdo (Sims).
4. Lubricar de 6 a 8 cm de la punta de la sonda rectal con gel lubricante hidrosoluble.
5. Pinzar el tubo después de que se instile toda la solución.
6. Abrir la llave reguladora y permitir que la solución entre despacio.

Respuestas:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- 3, 4, 2, 5, 6, 1.
- 3, 4, 2, 1, 6, 5.
- 4, 5, 6, 1, 2, 3.

345. Seleccione la secuencia correcta que la enfermera debe seguir para transferir a un paciente desde la cama a la silla:

1. Valora a la paciente para comprobar la correcta alineación en la posición sentada.
2. Facilita que el paciente se siente en la silla, flexionando las caderas y rodillas al tiempo que se va bajando al paciente a la silla.
3. Indica al paciente que utilice los reposabrazos de la silla para apoyarse.
4. Ayuda al paciente a sentarse en el borde de la cama y esperar unos minutos en esa posición.
5. Balancea al paciente hasta la posición de pies.
6. Flexiona las caderas y rodillas, alinea las rodillas con las del paciente.

Respuestas:

- 4, 6, 5, 3, 2, 1.
- 1, 3, 4, 5, 6, 2.
- 4, 3, 6, 5, 1, 2.
- 4, 6, 5, 1, 3, 2.

346. Seleccione los focos de auscultación cardiaca en el examen físico:

- a. Aórtico.
- b. Endocárdico.
- c. Pulmonar.
- d. Tricúspide.

e. Pericárdico.

f. Mitral

Respuestas:

- b, d, e, f.
- a, b, c, f.
- b, c, e, f.
- a, c, d, f.

347. Como enfermera/o de la comunidad, usted atiende un paciente con Tuberculosis Pulmonar. Como dato significativo de su historia psicosocial se destacan las malas condiciones socioeconómicas del paciente. ¿En cuál de las filosofías, teorías o modelos de Enfermería, se destaca este factor dentro del entorno como supuesto principal?

Respuestas:

- Filosofía de Virginia Henderson.
- Teoría de Hidelgard E. Peplau.
- Filosofía de Florence Nightingale.
- Teoría de Nola J. Pender.

348. Para la administración de penicilina G benzatínica se utiliza la vía _____ en un ángulo de _____.

Respuestas:

- Intramuscular - 90°.
- Intradérmica - 15°.
- Subcutánea - 45°.
- Intravenosa - 25°.

349. Se indica administrar 500ml de Lactato de Ringer en un tiempo de 24 horas. Calcular el número de gotas a administrar por minuto.

Respuestas:

- 6 gotas.
- 7 gotas.
- 8 gotas.
- gotas.

350. Sobre las competencias y deberes de enfermero y enfermera que se establecen en la Ley de ejercicio profesional de enfermería del Ecuador, señale la afirmación correcta:

Respuestas:

- Ejercer funciones asistenciales, administrativas, de investigación y docencia en su campo.

- Pertenecer y participar activamente a un gremio profesional.
- En casos de catástrofes el personal puede, a su elección, prestar sus servicios. Dar atención aunque no sea de su competencia a toda la población sin discrimen alguno.

351. En la preparación preoperatoria para cesárea, usted está realizando un cateterismo vesical. Durante el procedimiento la sonda se desliza al interior de la vagina. ¿Qué debe hacer usted?

Respuestas:

- Pedir ayuda a otro profesional de enfermería.
- Extraer la sonda y redirigirla hacia el meato urinario.
- Usar una sonda estéril nueva.
- Extraer la sonda y limpiarla con gasa para reutilizar.

352. ¿Cuál de los siguientes exámenes de laboratorio se encuentran contemplados en la biometría hemática?

Respuestas:

- Hemoglobina-fórmula leucocitaria.
- Amilasa-creatinina.
- Fibrinógeno- Dímero D.
- Bicarbonato –Exceso de base.

353. Seleccione la definición de mecánica corporal:

Respuestas:

- Esfuerzo coordinado de un músculo que determina el equilibrio.
- Uso coordinado de los músculos que no produce movimientos.
- Uso de la fuerza física al levantar objetos.
- Uso coordinado de los músculos para mantener el equilibrio y alineación.

354. Seleccione los alimentos recomendados en una dieta hipoalergénica.

Respuestas:

- Chocolate-huevos-banana.
- Galleta de arroz-papa hervida-ensaladas cocidas.
- Leche-mariscos-trigo.
- Maíz-embutidos-maníes.

355. Paciente de 66 años con diagnóstico de cáncer de páncreas, que decide poner fin a la terapia con citostáticos a pesar de las orientaciones del personal de salud para que continúe con la medicación, tras un debate con el paciente, los miembros de la familia y el equipo de salud, se acató la voluntad del paciente. ¿Qué principio de la bioética se pone de manifiesto?

Respuestas:

- Beneficencia.
- No maleficencia.
- Autonomía.
- Justicia.

356. Una paciente de 17 años solicita orientación sobre la aplicación de la nueva vacuna para VPH. Según la teoría de los sistemas planteada por Dorothea E. Orem. ¿Cuál se aplica en este caso?

Respuestas:

- Apoyo educativo.
- Parcialmente compensador.
- Totalmente compensador.
- Autocuidado.

357. ¿Cuál es el objeto de la disciplina del saber enfermero?

Respuestas:

- La enfermedad.
- La salud.
- Los pacientes.
- El cuidado.

358. Según Abraham Maslow y su teoría de las necesidades humanas, describe la supervivencia y desarrollo del sujeto como un proceso de búsqueda constante de seguridad. En qué nivel de la pirámide se encuentran las necesidades de seguridad del ser humano:

Respuestas:

- Primer nivel.
- Segundo nivel.
- Tercer nivel.
- Cuarto nivel.

359. La calidad es un concepto que ha evolucionado hasta nuestros días, existe un pensador que hace referencia a la calidad como la satisfacción del cliente. ¿Cuál es el autor que hace referencia al enunciado?

Respuestas:

- W. Edwards Deming.
- Joseph M. Juran.
- Walter A. Shewhart.
- Avedis Donabedian.

360. Según el modelo de causalidad, a las acciones u omisiones, incluyendo errores y violaciones, que tienen consecuencias adversas inmediatas, se les denomina:

Respuestas:

- Fallas recurrentes.
- Fallas latentes.
- Fallas inactivas.
- **Fallas activas.**

361. Adulto mayor con diagnóstico de diabetes acude al centro de salud porque indica que su familia no apoya los buenos hábitos de alimentación lo que le dificulta mantener la dieta prescrita. Usted como personal de enfermería le indica otras alternativas para seguir con el régimen terapéutico y le anima a tomar una decisión. ¿Cuál es el rol del personal de enfermería frente al caso?

Respuestas:

- Educadora.
- **Consejera.**
- Cuidadora.
- Gestora de casos.

362. Paciente de 8 años ingresa a emergencia acompañada de su madre la cual refiere que presenta fiebre, dolor de garganta y malestar general, a la valoración de enfermería se reporta al familiar que la niña se encuentra sana y que no presenta la sintomatología mencionada, por lo que la madre se siente inconforme y solicita una nueva valoración. ¿Cuál es la barrera de comunicación que se presenta en el caso?

Respuestas:

- **Desafío.**
- Sondeo.
- Estereotipía.
- Comprobación.

363. Paciente de 40 años va a ser intervenido quirúrgicamente por presentar cuadro de Colecistitis, el médico tratante explica y entrega el consentimiento informado para que firme la autorización correspondiente. ¿Qué derecho de la ética sanitaria está ejerciendo?

Respuestas:

- **Autonomía.**
- Beneficiencia.

- Justicia.
- No maleficiencia.

364. Como profesional de enfermería presenta una ponencia acerca de “Manejo de paciente diabético en un Congreso Internacional” que servirá como aporte a la creación de nuevos protocolos. ¿Qué nivel de comunicación está aplicando?

Respuestas:

- Comunicación en grupos pequeños.
- Comunicación intrapersonal.
- Comunicación pública.
- Comunicación transpersonal.

365. ¿Cuál es la finalidad de los cinco momentos del correcto lavado de manos dentro de la atención hospitalaria según La Organización Mundial de la Salud (OMS)?

Respuestas:

- Proteger al paciente, personal de salud y su entorno de los microorganismos nocivos.
- Proteger al individuo, familia, comunidad de los microorganismos nocivos.
- Proteger a la comunidad, familia, individuos que se contacten de los microorganismos nocivos.
- Proteger al individuo, personal administrativo, familia de los microorganismos nocivos.

366. ¿Qué antiséptico se usa para la desinfección preoperatoria y técnicas de alto riesgo?

Respuestas:

- Alcohol etílico al 70%.
- Alcohol isopropílico 70%.
- Clorhexidina al 4%.
- Peróxido de Hidrógeno al 0.5%.

367. Los reflejos son una respuesta motriz involuntaria que se manifiesta de forma inmediata, tras la aplicación de un estímulo sobre un receptor específico. ¿Qué reflejos presenta el recién nacido a término?

1. Moro.
2. Ortolani.
3. Prensión palmar.
4. Babinsky.

- 5. Genu varum.
- 6. Genu valgum.

Respuestas:

- 1, 3, 4.
- 2, 5, 6.
- 1, 5, 6.
- 2, 3, 4

368. Al valorar al recién nacido, la piel está cubierta por una sustancia de color blanquecino, oleosa, que contiene células en descamación y grasa, además desaparece en 48 horas, se conoce como:

Respuestas:

- Lanugo fetal.
- Millium facial.
- Mancha mongólica.
- Vérnix caseoso.

369. Paciente gestante, primigesta de 28 años de edad, acude al centro de salud para control de su embarazo, refiere que la fecha de la última menstruación fue el 14 de mayo del 2020. ¿Aplicando la regla de Naegele, qué fecha probable de parto sería?

Respuestas:

- 21 de febrero del 2021.
- 10 de febrero del 2021.
- 20 de febrero del 2021.
- 15 de febrero del 2021.

370. Paciente gestante de 30 años de edad con 30 semanas de gestación, tiene antecedentes de cesárea hace 10 años por complicaciones en el parto, presentación podálica del feto. Acude al centro de salud para control prenatal. La enfermera realiza la valoración para conocer en qué presentación se encuentra el feto. ¿Qué procedimiento es el indicado para este caso?

Respuestas:

- Movimientos fetales y auscultación fetal.
- Medición de altura uterina y cálculo de la edad gestacional.
- Tacto vaginal.
- Maniobras de Leopold.

371. En el servicio de Neonatología, usted valora a un RN de 37 semanas que presenta: síndrome de dificultad respiratoria con taquipnea, cianosis, quejido, aumento del esfuerzo con retracciones intercostales,



saturación de O₂ 89%, en la radiografía de tórax se puede evidenciar una discreta opacidad y resultado de gasometría alterado. ¿Cuál es la patología que presenta el RN?

Respuestas:

- Hipertensión pulmonar persistente.
- **Membrana Hialina.**
- Síndrome de aspiración de líquido meconial.
- Taquipnea transitoria.

372. Acude a la consulta una mujer que ha tomado anticoncepción hormonal oral y refiere que ha presentado diarrea, vómito, náusea y desea cambiar de método anticonceptivo. Indique. ¿Cuál es la recomendación que se debe valorar?

Respuestas:

- La inocuidad del método que viene determinada por la ausencia de **riesgos de salud.**
- El índice de Pearl que refleja el porcentaje de no embarazos de un método anticonceptivo.
- La aceptabilidad del método que viene determinada por la ausencia de efectos colaterales.
- La motivación o condicionamientos socioculturales como el nivel de educación que se tiene

373. Paciente de 35 años, tiene Rh negativo y ha dado a luz una niña con Rh positivo, por lo que está prescrita la administración de inmunoglobulina antiRh. ¿Cuáles son las precauciones que Usted seguiría en la administración de este medicamento?.

Respuestas:

- **Utilizar siempre la vía venosa y administrar a la mamá.**
- Administrársela a la mamá y al bebé por ser niña.
- Administrar simultáneamente con la vacuna de la rubéola.
- Las mismas que para transfundir sangre

374. Lucia presenta un embarazo de 12 semanas de gestación. Acude a la consulta de Emergencia de un hospital de segundo nivel, por presentar: fiebre de 38,5 grados, escalofríos, malestar general, náuseas, vomito, refiere dolor costo vertebral y deshidratación. El médico la valora y diagnostica pielonefritis. ¿Qué medicamento de primera elección debe tener listo la enfermera, en este caso?

Respuestas:



- Fosfomicina.
- Cefalosporina.
- Nitrofurantoina.
- Ampicilina.

375. Ingresa al servicio de Urgencias de un hospital, un niño de 7 meses de edad en brazos de su madre, con saturación de 91%, sin antecedentes de cuadro gripal y presenta sibilancias. El médico lo evalúa, le diagnostica con cuadro de obstrucción de la vía aérea, le manda a casa con las siguientes indicaciones: limpieza nasal con suero fisiológico cada 3-4 h; aumentar ingesta de líquidos y leche materna; explicar a la madre como cuidar al niño en casa; enseñar a la madre signos de alarma para regresar de inmediato al establecimiento de salud, no administrar, ni antibiótico, ni salbutamol, ni corticoides (no están indicados). Consulta de seguimiento en dos días. ¿A qué clasificación de obstrucción de la vía aérea corresponden estas indicaciones?

Respuestas:

- Crup leve.
- Sibilancia.
- Bronquiolitis.
- Bronquiolitis grave.

376. Al Centro de Salud tipo A, acude una madre con su niña de 9 meses en brazos, al verificar el crecimiento de la niña en la relación peso/longitud, el punto cae por debajo de la curva -3 de desviación estándar. Además, se palpa edema en ambos pies. ¿Cuál sería la clasificación del crecimiento de acuerdo con la normativa AIEPI?

Respuestas:

- Desnutrición aguda severa con complicación.
- Desnutrición aguda severa sin complicación.
- Desnutrición aguda moderada.
- Obesidad.

377. En el área de triage de urgencias obstétricas, usted atiende a una mujer de 35 años con embarazo de 21 semanas, con una tensión arterial de 140/90 mm Hg; ausencia de proteinuria. Refiere que en sus anteriores controles prenatales su presión arterial era normal. ¿A qué patología de los trastornos hipertensivos del embarazo corresponde el caso?

Respuestas:

- Preeclampsia leve.

- Preeclampsia grave.
- Eclampsia.
- Hipertensión gestacional.

378. Como enfermera del área de triage, usted atiende a una mujer de 30 años que refiere presentar un embarazo de 12 semanas según su último control, presenta dolor a nivel del hipogastrio tipo contracción. En la valoración ginecológica se encuentra con el cuello uterino cerrado. ¿A qué patología del embarazo corresponde el caso?

Respuestas:

- Aborto séptico.
- Aborto incompleto.
- Amenaza de aborto.
- Aborto diferido.

379. En el área de triage de urgencias obstétricas, usted atiende a una mujer de 38 años con embarazo de 23 semanas, con una tensión arterial de 150/100 mm Hg, presenta proteinuria 350 mg en orina de 24 horas. ¿A qué patología de los trastornos hipertensivos del embarazo corresponde el caso?

Respuestas:

- Hipertensión gestacional.
- Eclampsia.
- Hipertensión arterial crónica.
- Preeclampsia sin signos de gravedad (leve).

380. En un centro de salud ubicado en una ciudad que se encuentra a una altura superior a 2 500 metros sobre el nivel del mar. Usted prepara a una mujer de 36 años con embarazo de 28 semanas, presenta los siguientes signos vitales: frecuencia cardíaca 98 por minuto, frecuencia respiratoria 22 por minuto, tensión arterial 130/85 mm Hg, temperatura axilar 36°C, Sat O2 93%. ¿Cuál es el parámetro de la herramienta SCORE MAMÁ que dependiendo de la altura sobre el nivel de mar en la que se encuentre la usuaria, le asigna un puntaje de cero?

Respuestas:

- Saturación de Oxígeno.
- Frecuencia respiratoria.
- Temperatura.
- Frecuencia cardíaca.

381. En el área de triage de urgencias obstétricas, usted atiende a una mujer de 40 años con embarazo de 32 semanas, con una tensión arterial de

160/110 mm Hg, a los 20 minutos del ingreso presenta convulsiones tónico clónicas. ¿A qué patología de los trastornos hipertensivos del embarazo corresponde el caso?

Respuestas:

- Hipertensión arterial crónica.
- Eclampsia.
- Preeclampsia leve.
- Preeclampsia grave.

382. Paciente de 19 años, primigesta, ingresa a Centro Obstétrico por un parto en domicilio por ruptura prematura de membranas, en el puerperio inmediato, facies pálidas, mucosas orales secas, mamas ascretante, dolor en hipogastrio de 9/10, no se palpa fondo de útero, no diuresis, eliminación de loquios hemáticos en abundante cantidad. Signos vitales: T/A 86/48, FC 105 x min, FR 18 x min, T 39 °C. Sat O2 87%. ¿Dentro del proceso de atención de enfermería en los diagnósticos NANDA, cual priorizaría?

Respuestas:

- Dolor agudo r/c cambio de parámetros fisiológicos m/p dolor en escala de EVA 9/10.
- Riesgo de shock hipovolémico r/c complicaciones posparto.
- Riesgo de infección r/c ruptura prematura de membranas amnióticas y parto en domicilio.
- Hipertermia r/c aumento de la tasa metabólica m/p temperatura de 39°C.

383. En el área de post consulta, usted está presentando una charla educativa sobre estimulación temprana. Indica al cuidador que motive al niño a jugar con objetos que puedan ser apilados, demostrando cómo hacerlo (motor fino adaptativo). ¿A qué grupo de edad se refiere en la guía de estimulación temprana?

Respuestas:

- Niños de 6 a 8 meses.
- Niños de 4 a 5 meses.
- Niños de 9 a 11 meses.
- Niños de 18 a 23 meses.

384. Usted debe realizar una charla educativa a todas las madres con niños menores de 1 año, que acuden al centro de salud para recibir la dosis

correspondiente a la vacuna pentavalente que previene las siguientes enfermedades:

Respuestas:

- La difteria, el tétanos, la tosferina, la hepatitis B y Haemophilus influenzae de tipo B.
- La difteria, el sarampión, la tosferina, la hepatitis B y Haemophilus influenzae de tipo B.
- La difteria, el tétanos, la tosferina, fiebre amarilla Haemophilus influenzae de tipo B.
- La difteria, el tétanos, el rotavirus, la hepatitis B y Haemophilus influenzae de tipo B.

385. Identifique la saturación de oxígeno esperable en el recién nacido durante la reanimación post parto a los 3 minutos según lo descrito en el Normograma de Dawson:

Respuestas:

- 75 - 80%
- 70 -75%
- 80 - 85%
- 85 - 95%

386. Mujer gestante de 23 años con aproximadamente 4 semanas de gestación, acude a la unidad operativa a su primer control de embarazo, con náuseas, flatulencia e irritabilidad. El médico le prescribe un medicamento que sirve de profilaxis durante el embarazo y período de lactancia, para prevenir defectos del tubo neural en el recién nacido. ¿Qué medicamento y dosis recibe la paciente?

Respuestas:

- Ácido fólico, tabletas de 5mg, dosis diaria.
- Carbonato de calcio, tabletas de 500mg, 1gr. diario.
- Sulfato ferroso, suspensión oral, dosis de 125 mg diarios.
- Carbonato de calcio, tabletas de 500 mg. 1 gr. diario.

387. Recién nacido de 72 horas de vida, durante el examen físico presenta dificultad para la succión y glicemia de 35mg/dl. El médico prescribe tratamiento parenteral con dextrosa para el manejo de la hipoglicemia. ¿Cuál es la vía y la solución que usted administra?

Respuestas:

- Dextrosa 13.5% vía periférica.
- Dextrosa 5% vía central.

- Dextrosa 50% vía central.
- Dextrosa 10% vía periférica.

388. Paciente de 38 semanas de gestación ingresa a centro obstétrico por presentar labor de parto. De acuerdo al protocolo de manejo, en la primera etapa de labor se deben realizar diversas actividades. ¿Cuál de las siguientes actividades realiza en esta etapa?

Respuestas:

- Valorar la necesidad de realizar episiotomía y estimular el inicio precoz de la lactancia materna.
- Auscultar la frecuencia cardíaca fetal y registrar la frecuencia, duración e intensidad de las contracciones.
- Administrar oxitocina 10 unidades y masajear de inmediato el fondo uterino a través del abdomen de la mujer.
- Realizar el masaje uterino cada 15 minutos y asegurar que el útero no se relaje después de detener el masaje.

389. Como líder de enfermería del servicio de Ginecología debe incluir lineamientos para la determinación del riesgo obstétrico y el manejo de emergencias; para lo cual debe organizar y revisar el KIT CLAVE ROJA. ¿Cuáles son los medicamentos que debe incluir en este KIT?

Respuestas:

- Sulfato de magnesio, hidralazina.
- Nifedipino, Gluconato de Calcio.
- Oxitocina, Misoprostol y Metil ergometrina.
- Ampicilina, Ceftriaxona.

390. En la unidad de Gineco-Obstetricia se encuentra hospitalizada paciente de 38 años, multípara que cursa embarazo de 32.6 semanas de gestación por ecografía del II trimestre. Al interrogatorio refiere que hace 18 horas siente salida de líquido transvaginal, de color transparente sobretodo cuando camina. Se realiza ecografia de control la misma que reporta indice de líquido amniótico (ILA) de 5 cm. Se diagnostica Ruptura Prematura de Membrana. ¿Qué acción de enfermería implementaría para evitar complicaciones materno-fetal?

Respuestas:

- Control de score mama cada 8 horas.
- Mantener a la paciente en reposo absoluto.
- Recomendar al paciente aumento de ingesta de líquidos claros.
- Trasladar inmediatamente al paciente a sala de parto.

391. Paciente primigesta de 23 años, con un embarazo de 19 semanas de gestación, acude a su primera consulta prenatal. Durante la entrevista que sostiene el o la profesional de enfermería, expresa cierta preocupación sobre la posibilidad de haberse expuesto al Virus de Inmunodeficiencia Humana, afirma que ha tenido tres compañeros sexuales y que desconoce el número de compañeras sexuales de su pareja. Durante la consejería, ¿Cuál de los siguientes estudios se debe realizar la paciente?

Respuestas:

- Número de células T.
- ELISA.
- Interleuquina 6.
- Western Blot.

392. Rosita de 30 años cursa su primer embarazo, muy preocupada acude a la unidad de salud indicando la aparición de manchas negras en su cara. Usted la tranquiliza diciendo que el problema es hormonal y que en el puerperio este problema desaparecerá, debido a:

Respuestas:

- La disminución de estrógenos.
- El aumento del lactágeno placentario.
- La disminución del lactágeno placentario.
- Elevación de estrógenos.

393. Recién nacido que al minuto de su nacimiento presenta llanto débil, tiene alteraciones en la frecuencia respiratoria, manos y pies azulados, su frecuencia cardíaca es de 80 por minuto, brazos y piernas con poco movimiento. De acuerdo al caso ¿A qué puntaje de APGAR corresponde?

Respuestas:

- 0 - 3
- 4 - 6
- 7 - 8
- 3 - 4

394. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador para disminuir la mortalidad materna, ha establecido la estrategia del Score MAMÁ, que es aplicado en todas las unidades públicas para evaluar el riesgo obstétrico. ¿De los siguientes criterios para evaluar el riesgo obstétrico, cual no corresponde?

Respuestas:

- Signos vitales completos.
- Proteinuria.

- Sangrado.
- Estado de consciencia.

395. ¿Cuál es rol y la postura del personal de enfermería en el fomento y promoción de la lactancia materna?

Respuestas:

- El personal de enfermería debe estar suficientemente capacitado para promover, apoyar y proteger la lactancia materna, tanto en madres primerizas como en madres experimentadas.
- La lactancia materna debe ser considerada una opción de alimentación para los recién nacidos e infantes pequeños, que puede ser reemplazada sin ningún problema por sucedáneos de leche.
- La lactancia materna es una práctica ancestral que se va perdiendo gracias a los adelantos de la ciencia y la tecnología. Las leches de fórmula superan a la leche humana debido a que pueden ser enriquecidas con las vitaminas que necesite.
- El personal de enfermería tiene que promocionar la lactancia materna, siempre que la madre se encuentre con la disposición y haya descansado suficiente. Las primeras horas posparto es recomendable darle al Recién Nacido leche de fórmula y/o agua azucarada para evitar la hipoglicemia.

396. Son muchas las creencias relacionadas a la lactancia materna en nuestro país, todo esto gracias a la riqueza intercultural que poseemos. Señale cual de las frases es la correcta:

Respuestas:

- Para tener más leche la madre debe tomar coladas (machica, plátano, maíz etc)
- Si la madre se asusta o tiene irás no debe dar el seno al infante.
- La madre no puede mojarse ya que se le irá la leche.
- Mientras más lacte el recién nacido, más leche la madre tendrá.

397. ¿Cuál es la primera causa de muerte infantil en el Ecuador actualmente, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 2016?

Respuestas:

- Dificultad respiratoria del recién nacido.
- Sepsis bacteriana del recién nacido.
- Neumonía, organismo no especificado.
- Otras malformaciones congénitas del corazón.

398. En mujeres que tienen el antecedente de operación por cesárea, y sea viable un parto vaginal. Que aspecto debe considerarse para no tener complicación:

Respuestas:

- Embarazos múltiples.
- Siempre que la cesárea anterior haya sido por distocia.
- Que la madre tenga un período intergenésico de al menos dos años y ninguna otra contraindicación.
- Feto menor a 4000 gr y edad gestacional mayor a 41 semanas.

399. Para calentar a un recién nacido hipotérmico, se debe ajustar la temperatura de la incubadora por encima de la temperatura axilar del RN, en un máximo de:

Respuestas:

- 1 °C.
- 1.5 °C.
- 2 °C.
- 2.5 °C.

400. ¿Qué siglas le corresponden a un Recién Nacido de 39 semanas de gestación, con peso de 1500gr ?

Respuestas:

- RNAT -PAEG.
- RNAT -PEEG.
- RNAT -PMBN.
- RNAT- PBED.